

Агрометеоролошка прогноза за новембар

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.11.2022 Брой: 11/2022



Tokom prve polovine novembra, agrometeorološki uslovi će biti određeni suvremenim vremenom i temperaturama iznad klimatskih normi. Do sredine meseca, ograničavajući faktor za razvoj posejanih jesenjih useva i dalje će biti deficit vlage u zemljištu. U delovima južnih i jugoistočnih regiona (agrometeorološka stanica Karnobat), nastala suša će dovesti u pitanje preživljavanje dela proklijalih i nicanih useva.

Krajem oktobra, nivo rezervi vlage u zemljištu u sloju od 50 i 100 cm bio je neobično nizak, na mnogim mestima u južnoj Bugarskoj – ispod 40% poljskog vodnog kapaciteta (agrometeorološke stanice: Plovdiv, Pazardžik, Sliven). U delovima jugoistočnih regiona (agrometeorološka stanica Karnobat) nije bilo vlage u celom jednometarskom sloju zemljišta.

Početak novembra, suša će ograničiti izvođenje sezonskih obrada zemljišta i, na delu poljoprivrednih površina, odložiti setvu ozimih žitarnica van agrotehničkih rokova.

Tokom druge polovine novembra, agrometeorološki uslovi će doživeti promenu. Od sredine druge do sredine treće dekade, predviđeni su padavine, kao i poboljšanje rezervi vlage u zemljištu u gornjim slojevima i u uslovima za napredovanje početnih faza vegetacije posejanih jesenjih useva. U ovom periodu, razvoj ozimih žitarnica će se odvijati na prosečnim dnevnim temperaturama bliskim klimatskim normama za drugu polovinu meseca.

Krajem novembra, pšenica i ječam će biti u fazama nicanja i formiranja 1., 2. i 3. lista. Za mali deo useva na pojedinim mestima u regionima Podunavske nizije (agrometeorološke stanice: Bazovec, Novačene, u regionu Ruse), gde su lokalne padavine početkom jeseni obezbedile vlagu za početnu vegetaciju ozimih žitarnica, primećena će biti i faza busanja.

Tokom meseca nisu predviđene kritične minimalne temperature za nicanje jesenje useve. Početkom novembra, pregled useva na prisustvo štetočina – pšeničnog minera, žitnih mušica – mora se nastaviti, a gde njihova gustina premašuje ekonomski prag štetnosti (za žitne mušice EPŠ je 3–4 kom/m², za pšeničnog minera – preko 3 larve/m²), treba izvršiti pravovremenu zaštitu.

Povoljni uslovi za izvođenje jesenjih tretmana zaštite bilja u voćnjacima radi ograničavanja infekcija parši, rane smeđe truleži, rupičavosti lišća, kovrdžavosti lišća breskve i drugih prezimljujućih patogena, nastupiće tokom prve polovine novembra, a za sadnju voćaka – tokom treće dekade.

Izvor: NIMH