

Децембар – обратите пажњу на фитосанитарне активности у вишегодишњим усевима

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 07.12.2022 Брой: 12/2022



Većinu dana u decembru, agrometeorološke uslove će odrediti dinamično vreme, sa naizмениčnim kratkim periodima prosečnih dnevnih temperatura oko, ispod i iznad klimatskih normi.

Na početku meseca, povećana vlažnost u gornjim slojevima zemljišta će ograničiti izvođenje sezonskih obrada zemljišta. Sredinom perioda, ne očekuju se padavine, što će pružiti priliku za sprovođenje fitosanitarnih mera u višegodišnjim zasadima.

Hlađenje krajem novembra dovelo je do usporavanja, a na višim poljima i Predbalkanu, gde se formirao snežni pokrivač, do prestanka vegetativnih procesa u jesenjim usevima.

Početak decembra predviđa se porast temperatura, ali njihove prosečne dnevne vrednosti, sa izuzetkom nekih lokaliteta u južnoj Bugarskoj i duž crnomorske obale, neće preći biološki minimum neophodan za vegetaciju ozimih žitarica.

Tokom meseca, u većem delu zemlje, jesenski usevi će ostati u stanju relativnog mirovanja. Izuzetak će se ponovo zabeležiti kod useva u južnim i jugoistočnim regionima krajem prve i tokom prve polovine druge dekade. U tom periodu predviđaju se temperature iznad normale, sa maksimalnim vrednostima iznad 10–12°C i uslovi za odloženu vegetaciju ozimih žitarica, ali promena fenološkog stanja useva je malo verovatna.

Ove godine, značajan deo useva pšenice će prezimiti u početnoj fazi svog razvoja. Suša tokom prve polovine jeseni u većem delu zemlje ograničila je i odložila vegetaciju ozimih žitarica. Iz tog objektivnog razloga, usevi će ući u zimu u različitim fenološkim fazama: nicanje, 1–2–3 lista i početak busanja. Samo mali deo useva pšenice na određenim lokalitetima u Podunavskoj ravni – agrometeorološka stanica Novachene i region Ruse – nalazi se u fazi busanja, u kojoj usevi najbolje podnose zimske uslove.

U decembru, predviđene minimalne temperature, do minus 9–10°C, u uslovima bez snežnog pokrivača i sa dužim trajanjem, predstavljaju rizik za nicanje, ali još neotpornije useve ozimih žitarica.

Očekivane padavine tokom meseca, oko i iznad normale, povećaće nivo rezervi vlage u sloju zemljišta od 50 i 100 cm. Nakon obimnih padavina u drugoj polovini novembra, koje su u mnogim delovima zemlje premašile 40–50 l/m², deficit vlage u jesenjim usevima je prevaziđen.

Izvor: NIMH