

Фебруар – обнавља мировање код јесењих усева и зауставља развој код неких коштуњавих воћних врста

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 05.02.2023 Брой: 2/2023



Hladan talas na kraju januara, nakon neuobičajeno visokih temperatura za tu sezonu, vratio je stanje mirovanja u usevima posejanim u jesen i sprečio preuranjeni razvoj kod nekih vrsta koštičavog voća.

U februaru će agrometeorološki uslovi biti sve dinamičniji. Tokom većine dana prve dekade biće određeni temperaturama ispod normale, ali bez kritičnih minimalnih vrednosti za poljoprivredne useve koji prezimljavaju. U većem delu zemlje, sa izuzetkom jugoistočnih regiona i crnomorske obale, predviđeni su pad snega, formiranje snežnog pokrivača i poboljšanje uslova za prezimljavanje useva posejanih u jesen.

Na početku druge dekade očekuje se zagrevanje i promena agrometeoroloških uslova. Predviđene temperature do kraja februara u većini ratarskih područja biće blizu klimatskih normi i održavaće ozime žitarice u stanju mirovanja. Izuzecima se ponovo očekuje u južnim regionima i duž crnomorske obale. U ovim regionima, tokom druge dekade, predviđa se da će prosečne dnevne vrednosti biti oko i iznad biološkog minimuma potrebnog za nastavak vegetativnih procesa u usevima posejanim u jesen. Krajem februara, usevi pšenice će se nalaziti u fazi trećeg lista i fazi busanja.

Tokom meseca, predviđene minimalne temperature, u opsegu od minus 12-13°C, su iznad kritičnih pragova za ozime žitarice koje su ušle u fazu busanja. Ove vrednosti, u uslovima bez snežnog pokrivača, predstavljaju rizik za useve koji prezimljavaju u fazi trećeg lista (agrometeorološke stanice: Kneža, Targovište, Kjustendil, Pazardžik, Čirpan, Sliven, Jambol, Donji Čiflik).

Očekivane padavine u februaru, oko i iznad klimatskih normi, povećaće rezerve vlage u zemljištu u slojevima od jednog i dva metra. Značajne padavine tokom druge i treće dekade januara, na mnogim mestima u zemlji iznad 60-70 l/m², a u nekim južnim regionima – iznad 120-130 l/m² (Haskovo-165 l/m², Kardžali-214 l/m², Čirpan-133 l/m², Stara Zagora-144 l/m²), naglo su podigle nivo rezervi vlage u usevima ozimih žitarica. U većini ratarskih područja, ukupna rezerva vode u usevima posejanim u jesen u jednogmetarskom sloju zemljišta dostigla je nivo iznad 90% PP (poljskog vodnog kapaciteta).

U februaru će se pogodniji uslovi za rezidbu u vinogradima i voćnjacima, i za izvođenje zimskih zaštitnih tretmana u voćnjacima, javiti tokom druge dekade. Česte padavine tokom meseca održavaće gornje slojeve zemljišta prezasićenim vodom, što će otežati prihranu useva posejanih u jesen azotnim mineralnim đubrivima i izvođenje predsetvene obrade zemljišta na površinama namenjenim setvi ranih prolećnih useva (grašak, grahorica, ovas, jareći ječam).

Izvor: RHMZ