

# Агрометеоролошка прогноза за март

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 14.03.2023 Брой: 3/2023



Klimatske anomalije tokom druge polovine februara, sa neuobičajeno visokim maksimalnim temperaturama za tu sezonu, koje su premašivale 21-22°C u mnogim nizijskim područjima (Kneža - 24°C, Loveč - 23°C, Pleven - 23°C, Plovdiv - 23°C, Čirpan - 23°C), dovele su do aktivacije vegetacionih procesa u jesenjim usevima i do prevremenog razvoja voćaka.

Tokom prve dekade marta, samo na pojedinim mestima u južnoj Bugarskoj – Plovdiv, Pazardžik, Sandanski, Kardžali i Haskovo, zabeležene su ekonomski značajne padavine od 20-30 l/m<sup>2</sup>, što je dovelo do poboljšanja rezervi vlage u zemljištu kod jesenjih useva.

U centralnim i istočnim regionima, temperature su bile iznad klimatskih normi i iznad biološkog minimuma neophodnog za vegetaciju ozimih žitarica.

Tokom većine dana druge dekade u nizijskim regionima zemlje, predviđaju se temperature bliske uobičajenim za taj period, kao i uslovi za odloženu vegetaciju kod ozimih žitarica.

Povećanje temperatura i aktivacija vegetacionih procesa u jesenjim usevima i višegodišnjim zasadima očekuje se tokom prve polovine treće dekade. Krajem marta, dominantna faza kod pšenice i ječma biće faza busanja.

Tokom meseca, voćne kulture će proći kroz različite faze - od bubrenja i pucanja voćnih pupoljaka do zelenog grozda, cvetanja i zamatanja ploda kod ranocvetajućih koštičavih vrsta (badem, kajsija, breskva).

U martu se predviđaju minimalne temperature u opsegu od minus 5-10°C – vrednosti kritične za cvetove i mlade plodove voćaka.

Očekivane padavine tokom meseca, oko i iznad normale, povećaće rezerve vlage u zemljištu u sloju od 100 cm. Kao rezultat padavina ispod normale u februaru, nivo rezervi vlage u zemljištu u slojevima od 50 i 100 cm kod ozimih žitarica u krajnje južnim i jugoistočnim regionima bio je neuobičajeno nizak za sezonu – na pojedinim mestima ispod 55% poljskog vodnog kapaciteta (agrometeorološke stanice Sliven, Čirpan).

U martu, predviđena dinamična vremenska situacija, sa čestim padavinama, otežaće sprovođenje sezonskih agrotehničkih aktivnosti. Povoljniji uslovi za izvođenje zaštite bilja pred cvetanje kod voćaka nastupiće tokom druge polovine prve dekade. Tokom meseca, povećani sadržaj vlage u gornjim slojevima zemljišta ograničiće izvođenje predsetvene obrade zemljišta na površinama predviđenim za setvu ranih i srednje ranih prolećnih useva. Iz tog razloga, postoji verovatnoća propuštanja optimalnih rokova setve suncokreta u južnim regionima.

Sredinom marta počinje agrotehnički period (15-20.03) za setvu suncokreta u južnoj Bugarskoj, a sredinom treće dekade (25.03–5.04) – u Podunavlju.

**Gde i kada u različitim regionima zemlje će postojati uslovi za sprovođenje mera zaštite bilja, pogledajte [OVDE](#)**

*Izvor NIMH*