

Током треће деценије априла, услови ће бити повољни за повећање инфективног потенцијала бројних гљивичних обољења.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 22.04.2023 Брой: 4/2023



Tokom naredne sedmodnevne periode, agrometeorološki uslovi će biti određeni promenljivim vremenskim prilikama sa čestim padavinama, što će održavati veoma dobar nivo rezervi vlage u zemljištu u sloju od 50 cm i dobre uslove za vegetaciju ozimih useva i novosejanih prolećnih useva. Značajne padavine koje su pale tokom prve i druge dekade aprila u većem delu zemlje premašile su mesečne norme (Vidin - 61 l/m², Vraca - 84 l/m², Veliko Trnovo - 74 l/m², Razgrad - 103 l/m², Silistra - 77 l/m², Šumen - 86 l/m², Dobrič - 80 l/m², Haskovo - 77 l/m², Kardžali - 60 l/m², Elhovo - 91 l/m², Stara Zagora - 77 l/m², Karnobat - 68 l/m²) i popravile rezerve vlage u

dubljim slojevima zemljišta. Krajem druge dekade na većini ratarskih površina, rezerve vlage u zemljištu u sloju od 50 cm za ozime žitarice dostigle su nivo iznad 80–85% poljskog vodnog kapaciteta.

Većinu dana predstojećeg perioda, razvoj poljoprivrednih useva će se odvijati umerenom brzinom, na temperaturama bliskim, a na kraju perioda nešto ispod, klimatskih normi. Tokom perioda, pšenica će uglavnom biti u fazi izdizanja stabila, a kod ječma, na pojedinim mestima u Podunavlju (agrometeorološka stanica Novačene), primećivaće se i početak klasanja. Ozimi uljana repica će uglavnom biti u fazi cvetanja. U usevima suncokreta i kukuruza, u zavisnosti od rokova setve, primećivaće se nicanje i formiranje listova.

U severnoj centralnoj i severozapadnoj Bugarskoj, ponovo zbog dugotrajnih kiša i nepovoljnih klimatskih uslova, odlaže se setva. Proizvođači su obezbedili potrebno seme, površine su pripremljene i, pod povoljnim uslovima, poljoprivrednici su spremni da poseju pri prvoj prilici. Dosadašnje posejane površine su veoma male u poređenju sa istim periodom prethodnih godina.

Predviđene česte padavine tokom treće dekade aprila stvoriće uslove za povećanje infektionog pritiska od brojnih gljivičnih oboljenja: septorioze lisnih pegavosti i lisne rđe na ozimim žitaricama; na vočkama – uvenuće cvetova (rana braon trulež), rupavost lišća, kovrdžavost lišća breskve, parš, što zahteva, pri prvoj prilici nakon prestanka padavina, blagovremenu primenu mera zaštite bilja.

Izvor: NIMH