

Честе падавине и нестабилно време током друге половине маја

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 20.05.2023 Брой: 5/2023



U narednom periodu agrometeorološke uslove će ponovo određivati nestabilno vreme, sa čestim padavinama, što će održavati dobre rezerve vlage u sloju zemljišta od 50 i 100 cm.

U većem delu zemlje, sa izuzetkom pojedinih lokaliteta u istočnim regionima (Čirpan, D. Čiflik, Karnobat), rezerve vlage u zemljištu u jednodmetarskom sloju za usejeve seti u jesen su iznad 80% poljskog vodnog kapaciteta (PVK).

Tokom perioda, razvoj poljoprivrednih useva će se odvijati umerenim tempom, pri prosečnim dnevnim temperaturama bliskim klimatskim normama za drugu polovinu maja. Do sredine treće dekade, na poljskim

površinama, ozime žitarice će biti u fazi formiranja i nalivanja zrna. Krajem perioda, kod ječma na pojedinim lokalitetima u južnim regionima (Sandanski, Karnobat) takođe će se uočiti početak faze mlečne zrelosti.

Kod suncokreta i kukuruza, biće u toku formiranje listova.

Kod vinove loze, preovlađivaće faza izbijanja cvetnih grozdova. Ova fenofaza je kritična za infekciju vinove loze plamenjačom (*Plasmopara viticola*) i pepelnicom (*Uncinula necator*).

Predviđene padavine tokom perioda održavaće povoljne uslove za razvoj gljivičnih oboljenja: rđe, septorioze lisnih ploča i fuzarioze klasa kod pšenice; plamenjače kod povrtarskih kultura i vinove loze; kasne smeđe truleži plodova ranih sorti trešanja.

Krajem maja, štetu na srednje ranim sortama trešanja prouzrokuje trešanjeva mušica. Da bi se smanjila šteta od ovog opasnog štetnika, preporučuje se da se na početku faze zrenja, pri prvoj prilici nakon prestanka padavina, izvrši tretman insekticidima sa kratkim prethodnim periodom do žetve.

Izvor: RHMZ