

Povećana verovatnoća tuča i visok infekcioni pritisak gljivičnih patogena u poljoprivrednim usevima u junu

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 06.06.2023 Брой: 6/2023



Tokom prve dekade juna, agrometeorološke uslove će odrediti nestabilno i za sezonu prohladno vreme.

Predviđene padavine tokom dekade održaće visok nivo zaliha vlage u zemljištu u slojevima od 50 cm i 100 cm – na većini ratarskih površina iznad 80–85% poljskog vodnog kapaciteta (PVK). Prisustvo vrlo dobrih zaliha vlage u zemljištu na početku juna pozitivno će uticati na ozime žitarice, u kojima će u usevima u južnim i jugoistočnim regionima zemlje teći punjenje zrna, formiranje zrna i faza mlečne zrelosti. U interfaznom periodu punjenje zrna – mlečna zrelost, štetu na pšenici nanose larve štitastog smrdljivca, što zahteva terenski pregled useva i, kada gustina štetočina pređe prag ekonomske štete (2 larve/m²), pravovremenu zaštitu.

Nakon prohladnog vremena na početku druge dekade, predviđa se porast temperatura i ubrzanje razvojnih faza poljoprivrednih useva. Do sredine juna, na većini ratarskih površina, ječam će dostići fazu voštane zrelosti.

Tokom većine dana druge polovine juna, razvoj poljoprivrednih useva odvijace se na temperaturama bliskim klimatskim normama. Na početku treće dekade, pšenica će pretežno biti u fazi sazrevanja.

Do kraja meseca, deo jarih useva ući će u reproduktivne faze razvoja: kod suncokreta primećujeće se početak cvetanja, a kod ranih hibrida kukuruza – metličanje i cvetanje metlice.

Meteorološki uslovi u junu održavaće povišeni infektivni fond gljivičnih patogena: plamenjače na povrtarskim kulturama, kasna smeđa trulež na kasnijim sortama trešnje, krastavost i pepelnica na voćnim drvetima. Kod vinove loze, interfazni period od cvetanja cvatova do zmetanja bobica veličine graška kritičan je za infekciju plamenjačom.

Tokom meseca, povoljniji uslovi za izvođenje tretmana zaštite bilja javiće se u prvoj polovini druge i tokom većine dana treće dekade.

U junu će verovatnoća za pojavu gradnih oluja ostati povišena. Nakon gradne oluje, oštećene voćne i povrtarske kulture treba tretirati pri prvoj prilici (poželjno u roku od 48 sati nakon pojave) fungicidima na bazi bakra.

Izvor: RHMZ