

'U voćnjaku u julu'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.07.2023 Брой: 7/2023



U julu mesecu, u **jabučnjacima** gde nije došlo do infekcije paršom, prskanje protiv ove bolesti se obustavlja. U prisustvu infekcije na lišću i plodovima i uz česte pljuskove, rizik od kasnih infekcija i povećanja stepena oštećenja ploda se nastavlja, što u ovom slučaju zahteva tretmane čak i tokom ovog perioda.

Za sorte jabuka koje su osetljive na pepelnicu, prskanje protiv ove bolesti se takođe nastavlja. Za istovremenu kontrolu obe bolesti, koristi se jedan od sledećih fungicida: Bellis – 80 g/da, Sulgran – 750 g/da i Kumulus – 600–900 g/da protiv pepelnice, i Chorus 50 WG – 0.03%, Difcor 250 EC – 15 ml/da, Koprations Duo – 300 g/da, Scab – 300 ml/da i Captan 80 WG – 150–180 g/da protiv parše. Za istovremenu kontrolu obe bolesti, pogodni su sledeći: Flint Max 75 WG – 0.02%, Score 250 EC – 0.02%, Luna Experience – 20–75 ml/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da, Revyona – 200 ml/da.

Da bi se sprečila pojava rezistencije gljive koja izaziva paršu (*Venturia inaequalis*), najbolje je naizменично koristiti proizvode sa različitim mehanizmina delovanja na patogen ili koristiti smeše fungicida za njegovu kontrolu.

Otporni sorte na paršu – Prima, COOP-10, Frolina, Liberty, Jonafree, Jonathan, Pioneer, McFree, Pilot, Topaz, Novamak, Sava, Rubinola, itd., prskaju se samo protiv pepelnice.

Za **krušku**, prskanje protiv parše i belih i braon pegavosti lišća se mora nastaviti. Za kontrolu ovih bolesti, koristi se jedan od sledećih fungicida: Difcor 250 EC – 15 ml/da, Luna Experience – 20–75 ml/da, Captan 80 WG – 150–180 g/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da.

Za **šljivu** u julu, prskanje je usmereno protiv monilioze i rđe. Protiv monilioze, prskanje se vrši sa jednim od sledećih fungicida: Difcor 250 EC – 20 ml/da, Captan 80 WG – 150–180 g/da, Chorus 50 WG – 0.045%, Geoxe – 40–60 g/da. Protiv rđe, odobren je Signum WG – 45 g/da, koji je takođe efikasan protiv monilioze.

Početakom jula, plodovi ranih sorti **breskve** počinju da sazrevaju i tokom ovog perioda se ne prskaju. Za **kasne sorte breskve**, kontrola pepelnice, sušice i monilioze se nastavlja. Protiv pepelnice, koristi se jedan od sledećih fungicida: Score 250 EC – 0.02%, Luna Experience – 50 ml/da, Topaz 100 EC – 0.03%, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da. Za kontrolu monilioze, prskanje se vrši sa Delan 700 WDG – 0.05%, Chorus 50 WG – 0.045% ili Luna Experience – 63–75 ml/da.



U julu, kajsije sazrevaju i one se ne prskaju.

Za **malinu**, tokom ovog perioda se ne vrši prskanje, sa izuzetkom **remontantnih sorti** kao što je Lyulin. Za njih su potrebni tretmani protiv didimele i antraknoze. Koristi se jedan od sledećih fungicida: Signum WG – 100 g/da i Funguran OH 50 WP – 0.15%. Uz česte pljuskove i visoku vlažnost vazduha, neophodno je i prskanje protiv sive truleži. Koristi se Switch 62.5 – 100 g/da.

Posle berbe, lišće **zasadima jagode** se kosi, uklanja sa plantaže i uništava spaljivanjem ili zakopava kako bi se razgradilo.