

Септембар – повољни услови за формирање додатног приноса од касних повртарских усева

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.09.2023 Брой: 9/2023



U većini dana prve dekade septembra predviđeni su iznadprosečni termički uslovi, što će ubrzati završne faze razvoja kasnih poljoprivrednih useva. U ovom periodu srednje-kasni hibridi kukuruza biće u fazi voštane i potpune zrelosti, dok će kasni hibridi biti u fazi mlečne zrelosti i prelazu u voštanu zrelost.

Na početku druge dekade, agrometeorološki uslovi će se promeniti. Do sredine treće dekade, oni će biti određeni nestabilnim vremenom i temperaturama blizu klimatskih normi. U ovom periodu predviđaju se padavine od ekonomskog značaja, koje će, nakon produbljene suše, poboljšati uslove za izvođenje predsetvene

obrade površina namenjenih setvi jesenjih useva. Do kraja druge dekade septembra je optimalni agrotehnički rok za setvu ozimog uljane repice.

Tokom druge dekade, i kasni hibridi kukuruza će završiti svoj razvoj, a pirinač će biti u fazama voštane i potpune zrelosti. Predviđene česte padavine tokom druge i prve polovine treće dekade povećaće rizik od razvoja patogena koji izazivaju trulež zrele voćne i povrtarske proizvodnje – sive truleži grožđa (*Botrytis cinerea*), kasne braon truleži (*Monilinia fructigena*) na plodovima jesenjih i zimskih sorti voćaka, plamenjače krompira (*Phytophthora infestans*) na paradajzu iz kasne proizvodnje, itd.

U drugoj polovini treće dekade očekuju se suvo vreme i povoljni uslovi za berbu grožđa. Kao rezultat iznadprosečnih letnjih temperatura, neke od kasnijih vinogradarskih sorti dostići će tehnološku zrelost ranije od uobičajenih rokova.

Krajem septembra, preporučljivo je pregledati zasad krušaka na prisustvo opasnog štetočine – pupoljkaša kruške. Suzbijanje ove štetočine efikasno je samo protiv odraslih jedinki na početku jeseni. Ako gustina štetočine premašuje ekonomski prag štetnosti (3 jedinke po stabilu), neophodna je zaštita.

U septembru se ne predviđaju kritične minimalne temperature, a uslovi će omogućiti formiranje dodatne proizvodnje od kasnih povrtarskih kultura osetljivih na mraz.

Izvor: RHMZ