

Октобар – оптимални услови за сетву озимих житарица и додатна производња од повртарских усева и касних сорти воћака и ВИНОВЕ ЛОЗЕ

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 01.10.2023 Брой: 10/2023



U oktobru će agrometeorološke uslove određivati temperature oko i iznad klimatskih normi i padavine oko i ispod mesečnih normi.

Početkom oktobra, prognozirane temperature iznad normale, sa maksimalnim vrednostima do 30-32°C, ubrzaće procese zrenja kod kasnih sorti voćaka i vinove loze, i stvoriće uslove za branje dodatnog prinosa od povrtarskih kultura kasne poljske proizvodnje (paradajz, paprika, tikvice, kornišoni). Kao rezultat toplih uslova iznad

normale, kasne sorte crnog vinskog grožđa će dostići tehnološku zrelost ranije od uobičajenih rokova, a jesenje sorte voćaka će dostići zrelost za branje.

Nakon relativno suvog i toplog za godišnje doba vremena tokom druge polovine prve dekade, agrometeorološki uslovi će se promeniti. U tom periodu se prognozira značajan pad minimalnih temperatura, sa uslovima za stvaranje mraza u kotlinama i na višim poljima, što će zahtevati pravovremenu žetvu povrtarskih kultura osetljivih na mraz (paradajz, paprika).

Krajem prve i početkom druge dekade, očekuju se padavine od ekonomskog značaja, poboljšanje rezervi vlage u zemljištu u gornjim slojevima zemljišta, i uslova za izvođenje sezonskih obrada zemljišta. Suša krajem leta i početkom jeseni u mnogim delovima zemlje, sa izuzetkom jugoistočnih regiona, odložila je predsetvene pripreme površina predviđenih za setvu jesenjih useva. Iz tog razloga, u velikom delu ratarskih regiona, propušteni su agrotehnički rokovi u septembru za setvu ozimog uljane repice.



Oktobar je optimalni period za setvu ozimih žitara. Tokom prve dekade je agrotehnički rok za setvu pšenice u Severnoj Bugarskoj, od 15. do 25. oktobra u Južnoj Bugarskoj, a krajem meseca – duž crnomorske obale.

Većinu dana u drugoj polovini oktobra, početne faze vegetacije posejanih jesenjih useva će se odvijati pod toplotnim uslovima iznad normale. Sredinom i krajem treće dekade, postoji prognozirana verovatnoća padavina,

poboljšanja rezervi vlage u zemljištu u sloju od 50 cm, i uslova za razvoj ozimih žitara. Krajem oktobra, kod pšenice, u zavisnosti od rokova setve, primećuju se sledeće faze: nicanje i formiranje listova (1-3 lista).

Prognozirani toplotni uslovi u oktobru, oko i iznad norme, su preduslov za povećanje populacije obične voluharice – jedne od opasnih štetočina u jesenjim usevima. Krajem meseca, neophodno je pregledati jesenje useve na prisustvo štetočine, i tamo gde njena gustina prelazi prag ekonomske štete (2 aktivne kolonije po dekaru), neophodne su pravovremene mere zaštite bilja (otrovane mamke postavljene na ulaze u kolonije).

U voćnjacima jabuke i kruške, na početku opadanja lišća, nakon branja plodova, preporučuje se prskanje stabala 5% rastvorom uree. Ovaj tretman ograničava infekciju paršom.

Za koštuničave vrste voćaka, protiv bakteriozne raka, kovrdžavosti lišća breskve, rupavosti lišća i rane smeđe truleži kod kajsije, trešnje i višnje, nakon masovnog opadanja lišća, mora se izvršiti tretman 2% bordoškom mešavinom.

Izvor: NIMH