

Јануар почиње необично високим температурама

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.01.2024 Брой: 1/2024



Klimatske anomalije na početku zime, sa neuobičajeno visokim temperaturama preko 20–21°C na mnogim mestima, dovele su do ponovnog pokretanja vegetacionih procesa u jesenjim usevima u delovima ratarskih regiona zemlje. Neujednačeno toplo vreme izazvalo je, u nekim od krajnjih jugozapadnih regiona, preuranjeno i nepoželjno bubrenje pupoljaka kod određenih ranocvetajućih žbunastih i voćnih vrsta kao što su dren, kajsija, breskva i trešnja.

Početkom januara agrometeorološki uslovi će i dalje biti određeni iznadprosečnim temperaturama sa prosečnim dnevnim vrednostima u ratarskim regionima iznad biološkog minimuma potrebnog za pojavu odložene vegetacije kod ozimih žitarica.

Tokom druge polovine prve dekade predviđa se pad temperatura i promena agrometeoroloških uslova.

Očekivano hlađenje u ovom periodu prekinuće kasnu vegetaciju ozimih žitarica i otežaće nepravovremeni razvoj nekih drvenastih vrsta, što bi inače dovelo do smanjenja njihove otpornosti na zimu. Tokom druge i treće dekade agrometeorološki uslovi će biti određeni temperaturama bliskim klimatskim normama, što će održati ozime žitarice u stanju mirovanja.

U januaru, usevi pšenice i ječma će prezimiti u različitim fenološkim fazama. Kasno posejane ozime žitarice krajem jeseni, na agrometeorološkim stanicama Băzovec, Nikolaevo, Kazanlăk, Sliven i Chirpan, nalaze se u fazi nicanja i početnoj fazi formiranja listova. Kod useva posejanih u novembru u Kneža, Tărgoviște, Pazardžik, Haskovo i Ljubimec, dominira faza trećeg lista. Mali deo useva pšenice i ječma na pojedinim mestima u Podunavlju – agrometeorološka stanica Novachene – i u Gornjotračkoj niziji u regionu Plovdiva nalazi se u fazi busanja, što je odgovarajuća faza za prezimljavanje. U januaru predviđene minimalne temperature, do minus 13°C, neće predstavljati rizik za višegodišnje useve i za ozime žitarice koje su ušle u fazu busanja. U uslovima bez snežnog pokrivača, vrednosti u opsegu od minus 10–13°C, ako potraju duži vremenski period, biće kritične za kasno posejane, slabo formirane useve. Predviđene padavine u januaru, oko i iznad norme, povećaće rezerve vlage u zemljištu u slojevima od jednog i dva metra. Krajem decembra, rezerve vlage u zemljištu za pšenicu u sloju od jednog metra u većini ratarskih regiona bile su iznad 85–90% poljskog vodnog kapaciteta (PVK).

Tokom meseca, pogodniji uslovi za izvođenje zimskog rezidbe jabučastih voćaka javiće se na početku prve i tokom većine dana treće dekade.

Izvor: NIMH