

Фебруар – агрометеоролошке прилике са повећаном динамиком

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 07.02.2024 Брой: 2/2024



У фебруару ће агрометеоролошки услови бити веома динамични, са наизменичним периодима температура изнад норме и вредностима на нивоу и испад климатских норми за овај месец.

Током већине дана прве десетодневке, агрометеоролошке услове ће одређивати температуре високе за годишње доба. Прогнозиране просечне дневне вредности у обрадивим регионима земље достићи ће и премашити биолошки минимум потребан за наставак вегетативних процеса у озимим житарицама.

Прогнозиране температуре, високе за годишње доба током друге половине прве десетодневке фебруара, са максималним вредностима у опсегу од 15-20°C, покренуће превремени развој код неких раноцветајућих коштуњавих воћака (бадем, кајсија, бресква) у јужним и југоисточним регионима земље.

На крају прве и почетком друге десетодневке, агрометеоролошки услови ће се променити. Очекивани хладни талас ће успорити вегетацију јесење сетви и превремени, непожељни развој воћака.

Током друге половине фебруара, прогнозиране просечне дневне температуре у већем делу земље биће у опсезима који ће кочити развој презимљавајућих пољопривредних усева. Изузеци ће се запазити у крајње јужним и југоисточним регионима, где ће се крајем месеца створити услови за почетак одложене вегетације јесење сетве, али се не очекује значајна промена у фенолошким фазама усева. Крајем фебруара, усеви пшенице у фази развоја трећег листа ће доминирати.

Током месеца, прогнозиране минималне температуре, до минус 12°C, су изнад критичних прагова за усева пшенице који презимљавају у фази трећег листа и фази класања. У условима без снежног покривача и са дужим задржавањем, ове вредности представљаће ризик за касно посејане озиме житарице које су у почетној фази формирања листова (1-2 листа).

Очекиване падавине у фебруару, око и изнад норме, повећаће резерве јесењо-зимске влаге у земљишту, такође и у двослојном земљишном профилу. Крајем друге десетодневке јануара, резерве земљишне влаге за пшеницу у слоју од једног метра у већем делу земље, са изузетком неких локација у источним регионима (Разград, Д. Чифлик, Ћирпан, Сливен), биле су на нивоима изнад 90% пољског капацитета.



Током месеца, повољнији услови за обављање сезонских агротехничких радова — резба у виноградима и воћњацима, зимско прскање воћака фунгицидима на бази бакра, прихрањивање јесење сетве азотним минералним ђубривима, предсетвена обрада површина намењених за сетву раних пролећних усева (грашак, грахорица, овас, јарки јечам) — јављаће се током већине дана прве десетодневке и друге половине друге десетодневке.



У фебруару, поља пшенице морају се пратити на присуство опасног штеточина — обичне волухарице, а где њена густина прелази економски праг штетности (ЕТП — 1 активна колонија по декару), неопходне су благовремене мере заштите биља родентицидима овлашћеним за ту намену.

извор РХМЗ