

Током треће десетодневке марта – опасност од мраза

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 25.03.2024 Брой: 3/2024



Krajem druge i početkom treće dekade marta, na mnogim mestima u ratarskim predelima zemlje stvoreni su uslovi za nastanak mrazeva, koji su izazvali različite stepene oštećenja cvetova voćaka.

Tokom naredne sedmodnevne periode agrometeorološki uslovi će ponovo biti određeni dinamičnim vremenskim prilikama. Prognoziraju se prosečne dnevne temperature iznad biološkog minimuma neophodnog za odvijanje vegetacionih procesa u jesenjim usevima. Kod pšenice i ječma će se odvijati faza busanja. Samo na pojedinačnim lokacijama u južnim regionima zemlje primećuje se faza izdizanja stabljike.

Prema podacima Poljoprivrednog instituta Dobrudža (PID) - General Toševo, od oktobra 2023. do kraja februara ukupna količina padavina iznosi 205 litara po kvadratnom metru. Međutim, tokom prva dva meseca 2024. ukupno je palo 22 litra po kvadratnom metru. Istovremeno su zabeležene visoke temperature iznad 16°C i na mestima do 19,6°C. Pod ovakvim uslovima pšenica obično ne ulazi u stanje mirovanja.

Poslednjih godina, tokom meseca aprila svedoci smo onoga što je već postalo uobičajena pojava – naglih hladnoća sa niskim temperaturama i mrazovima. Prolećna hladnoća u kombinaciji sa sušom može ozbiljno da utiče na pšenicu.

U pojedinim poljima primećeno je prisustvo septorioze, ali je još uvek prerano za tretmane fungicidima, izvestio je prof. dr Ivan Kirjakov iz PID-a za Agri.bg. Krajem marta komisija koju je formiralo Regionalno upravno telo za poljoprivredu pregledaće useve pšenice u Dobričkom regionu kako bi se utvrdilo stanje useva, njihovi razvojni stadijumi i eventualni problemi koji zahtevaju rešavanje u žitnim područjima.

U trajnim zasadima javljaće se različite fenološke faze – od bubrenja pupoljaka i pucanja pupoljaka do formiranja cvetnih pupoljaka, cvetanja i listanja. Tokom prvih dana periode prognoziraju se mrazovi i negativne minimalne temperature, što će predstavljati rizik za voćne kulture koje su uznapredovale u svom razvoju.

Očekivane padavine u drugoj polovini periode ograničiće mogućnosti za terenske radove. Povoljniji uslovi za obavljanje sezonskih agrotehničkih aktivnosti – predsetvena obrada zemljišta i setva suncokreta, kao i tretmani zaštite bilja u poljoprivrednim usevima, biće dostupni na početku periode. Tretmane je potrebno sprovoditi pri mirnom vremenu i pri brzini vetra do 2-3 m/s. Tokom ove periode počinje optimalni agrotehnički rok za setvu suncokreta u Severnoj Bugarskoj.

Izvor: NIMH i Agri.bg