


Tokom treće dekade maja, za ozime žitarice dobro snabdevene vlagom, doći će do formiranja i nalivanja zrna.

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 23.05.2024 Брой: 5/2024



Nakon neuobičajeno hladnog vremena sredinom maja, tokom treće dekade meseca, prognozira se značajan porast temperatura, normalizacija toplotnih uslova i aktivacija vegetacionih procesa kod poljoprivrednih kultura.

Očekivane padavine krajem druge i početkom treće dekade u većini poljoprivrednih regiona će održati rezerve vlage u zemljištu unutar optimalnih granica u sloju od 50 i 100 cm – preko 85% PVK-a. Tokom ovog perioda, kod ozimih žitarica dobro snabdevenih vlagom, doći će do formiranja i nalivanja zrna. U jugoistočnim regionima (agrostacion Karnobat), kod ječma će se, ranije nego obično, takođe uočiti faza mlečne zrelosti.

Kod kukuruza i suncokreta doći će do formiranja listova. Krajem perioda, kod suncokreta posejanog u agrotehničkom roku, takođe će se uočiti početak formiranja cvasti.

Prognozirano nestabilno vreme sa čestim padavinama tokom narednog perioda održavaće povećan infektivni fond od gljivičnih patogena: kasna mrka trulež na dozrevajućim plodovima ranih sorti trešanja, siva plesan na jagodama, plamenjača na vinovoj lozi i povrtarskim kulturama, čađava krastavost na jabučastom voću, itd.



Trešnjina muva

Tokom treće dekade maja, trešnjina muva nanosi štetu srednje ranim sortama trešanja. Za ograničavanje štete od ove štetočine, preporučuje se tretiranje na početku faze zrenja plodova (kada plodovi trešnje počnu blago da ružičaste) insekticidom sa kratkom karencom.

U vinogradima treba nastaviti sa pregledima na prisustvo i štetnu aktivnost larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca, a u voćnim kulturama – na jabučnog smotavca, šljivinog smotavca i istočnog voćnog smotavca.

Tokom perioda, povećana vlažnost u gornjim slojevima zemljišta ograničavaće sezonsku obradu zemljišta i borbu protiv konkurentne korovske vegetacije.

Izvor NIMH