

# Agrotehničke aktivnosti u voćnjaku u junu

*Автор(и):* ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

*Дата:* 07.06.2024 *Брой:* 6/2024



U junu će agrometeorološke uslove određivati nestabilno vreme sa padavinama, oko i iznad mesečne norme, što će održavati dobre i vrlo dobre rezerve vlage u sloju zemljišta od 50 cm i 100 cm – iznad 75-80% od PVK. Niži nivoi rezervi vlage u zemljištu predviđaju se ponegde u ekstremnim severoistočnim i jugozapadnim regionima (Razgrad, Ruse, Silistra, Sandanski), gde su majske padavine bile ispod mesečne norme.

Početakom juna, razvoj poljoprivrednih kultura odvijaće se ubrzanim tempom, u nadprosečnim termičkim uslovima.

Tokom većine dana drugog desetodnevnog perioda, agrometeorološke uslove određivaće temperature bliske uobičajenim za taj period.

Tokom trećeg desetodnevnog perioda juna, predviđaju se nadprosečni termički uslovi, sa maksimalnim temperaturama do 35-36<sup>0</sup>C.

## *U voćnim rasadnicima*

Setvene leje se đubre sa 6-8 kg amonijum nitrata ili istom količinom drugog azotnog đubriva po dekaru i okopavaju. Po potrebi se navodnjavaju. Matičnjaci se đubre sa 10-15 kg amonijum nitrata ili istom količinom drugog azotnog đubriva po dekaru i zagrcu. Po potrebi se navodnjavaju pre zagrtanja. U rasadnicima se obavlja defolijacija pupoljaka kako bi se olakšao normalan rast kalemova. Podloge i rasadnici se pripremaju za kalemljenje.

## *U voćnim zasadima*

Vodi se računa da se vezovi na granama prekalemljenih voćaka i divljih formi ne useku, te ih je po potrebi potrebno blagovremeno olabaviti. Konkurentne mladice koje su izrasle iz matične biljke treba odmah ukloniti.

Novoposađena stabla se redovno okopavaju. Po potrebi ih zalivati.

Nakon drugog desetodnevnog perioda, mladi voćni zasadi se đubre sa 15-20 kg amonijum nitrata po dekaru i obavlja se plitka obrada zemljišta. Pri formiranju palmete, skeletne grane se savijaju kada dostignu ukupnu dužinu od 2 – 2,5 m za prvi sprat, 1,5-2 m za drugi, i 1 m za treći. Za slabo bujna stabla, postavljaju se pod uglom od 45-50<sup>0</sup>, a za bujna stabla – pod uglom od 45-45<sup>0</sup> u odnosu na horizontalu. Kada sprat ima skeletne grane različitih dužina, savija se samo jaka, dok se slaba ostavlja da raste i savija se kasnije.



Nastavlja se mehaničko proređivanje plodova breskve.

U područjima sa garantovanim navodnjavanjem, seju se usevi za zelenišno đubrenje.

Počinje masovna berba trešanja i višanja.



## *U zasadima jagoda*

Sade se poslednje sadnice jagoda, čuvane u frižideru. Nastavlja se plijevljenje mladih i novoposađenih useva. Po potrebi se navodnjavati. Berba se nastavlja. Ne brati tokom vrelih sati dana ili kada se formira rosa. Za svežu potrošnju, беру se zajedno sa čašičnim listićima.

Na toplijim lokalitetima, nakon berbe poslednjih plodova, slama se odmah sakuplja i uklanja. Zasadi se đubre sa 8-10 kg amonijum nitrata ili istom količinom drugog azotnog đubriva po dekaru, i obavlja se prva postžetvena obrada zemljišta. Ako je potrebno navodnjavanje, obavlja se pre đubrenja.



## *U zasadima malina*

Obavlja se redovna obrada zemljišta. Po potrebi zalivati. U zasadima koji rode, nastavlja se čišćenje redova od vrlo slabih i suvišnih izdanaka. Žičana konstrukcija se održava čvrstom. U nekim područjima, oko sredine juna, počinje berba plodova ranih sorti. Kada počne zrenje, pčelinje zajednice se premeštaju na druge zasade, ali na udaljenosti ne manjoj od 5 km.



## *U zasadima ribizle*

Zemljište u lejava za ožiljavanje se obrađuje 2-3 puta u zavisnosti od navodnjavanja, padavina i prisustva korova. Redovna obrada se sprovodi kako u mladim, tako i u rodnim zasadima. Oko sredine meseca, na nekim toplijim lokalitetima, počinje berba plodova.

## *U zasadima sa drugim kulturama*

Nastavlja se kalemljenje podloga limuna. Briga o spoljnom ožiljavanju reznica nara, smokve i morske krkavine se nastavlja, pri čemu se rasadnik redovno okopava i zaliva. Obavljaju se neophodni tretmani protiv korova. Pred kraj meseca, prošlogodišnje neobrađene podloge se kalemaju pupoljcima hurme. Nastavlja se vezivanje biljaka aktinidije za pomoćne kolce. Ćubrenje se vrši sa poslednjom 1/3 godišnje norme azota određene za aktinidiju. Bočni izdanci na glavnom stablu aktinidije se uklanjaju kako bi se stimulisao njen razvoj i opšte oblikovanje. Oblikuje se u obliku slova T.