


Jun – od nestabilnog vremena sa padavinama do natprosečno toplih uslova

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.06.2024 Брой: 6/2024



U junu će agrometeorološki uslovi biti određeni nestabilnim vremenom sa padavinama, oko i iznad mesečne norme, što će održavati dobre i veoma dobre rezerve vlage u sloju zemljišta od 50cm i 100cm – preko 75-80% PK (poljskog kapaciteta). Niži nivoi rezervi vlage u zemljištu predviđaju se ponegde u ekstremnim severoistočnim i jugozapadnim regionima (Razgrad, Ruse, Silistra, Sandanski), gde su majske padavine bile ispod mesečne norme.

Početak juna, razvoj poljoprivrednih kultura odvijaće se ubrzanim tempom, pod iznadprosečnim termalnim uslovima. Zbog visokih temperatura tokom prolećne vegetacije pšenice i ječma, oni će završiti svoj razvoj ranije nego obično. Tokom prvih deset dana juna, za ječam u poljskim područjima biće zapažena masovna voštana

zrelost, a krajem dekade - puna zrelost. Za pšenicu će se tokom ovog perioda javiti mlečna, prelazna u voštanu i voštana zrelost.

Tokom većine dana druge dekade, agrometeorološki uslovi biće određeni temperaturama bliskim uobičajenim za taj period. Sredinom dekade, ozime žitarice na visokim poljima ući će u fazu sazrevanja. Za kukuruz će se odvijati formiranje listova, a za suncokret će preovladavati formiranje cvasti.

Tokom većeg dela perioda od 7. do 13. juna, agrometeorološki uslovi biće određeni toplim vremenom sa verovatnoćom lokalnih padavina i grada. Maksimalne temperature će tokom celog perioda prelaziti 30°C, dostižući 38°C u Trakijskoj niziji, što je preduslov za toplotni stres i pogoršanje uslova za normalan razvoj gajenih biljaka u njihovim vegetativnim i generativnim fazama.

Početak druge dekade juna, za kukuruz će se odvijati formiranje listova; za suncokrete posejane u optimalnom agrotehničkom roku - formiranje cvasti; za mahunarke (pasulj, soja) - pupanje i cvetanje. Za ječam u poljskim područjima preovladavaće voštana zrelost. Za pšenicu će se javiti masovna mlečna i voštana zrelost. Za uljanu repicu biće zapažena faza sazrevanja.

Predviđeni iznadprosečni termalni uslovi tokom treće dekade juna ubrzaće vegetaciju jarih useva, a neki od njih će ući u reproduktivne faze svog razvoja. Za useve suncokreta posejane u optimalnom agrotehničkom roku, biće zapažen početak faze cvetanja, a za ranije hibride kukuruza - metličanje i opadanje polena. Tokom ovog perioda, prognoziraju se maksimalne temperature do 35-36°C, što će negativno uticati na cvetanje i oplodnju povrtarskih kultura.

U junu, predviđene česte padavine su preduslov za razvoj gljivičnih bolesti: kasna mrka trulež, čađavost i pepelnica na vočkama; plamenjače na povrtarskim kulturama; plamenjača, pepelnica i siva plesan na vinovoj lozi. Pogodniji uslovi za sprovođenje prskanja za zaštitu bilja biće stvoreni tokom druge polovine meseca.

! Visoke temperature i niska vlažnost vazduha ograničiće mogućnosti sprovođenja mera zaštite bilja i otežaće terenske radove.

Izvor NIMH