

Agrotehničke aktivnosti u voćnjaku u julu

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 07.07.2024 *Брой:* 7/2024



Većinu dana u drugoj i trećoj dekadi jula očekuje se relativno sušno i veoma vruće vreme, sa maksimalnim temperaturama između 35-40°C. Predviđene visoke temperature u julu i relativno sušno vreme će ograničiti razvoj gljivičnih oboljenja u višegodišnjim zasadima, sa izuzetkom pepelnice. Očekivane padavine oko i ispod mesečne norme zahtevajuće sprovođenje pojačanog režima navodnjavanja.

U rasadnicima voća

Gredice se redovno zalivaju i obrađuju kako bi se obezbedio što veći procenat standardnog podloga materijala. Matični zasad se zaliva i, po potrebi, okopava.

Kako bi se obezbedili uslovi za dobar razvoj kalemljenih biljaka, u parcelama rasadnika druge godine po potrebi se vrši odstranjivanje pupoljaka. Redovno se vrši obrada i navodnjavanje, posebno u rasadnicima kruške.

U parcelama rasadnika prve godine počinje se sa okulizacijom podloga, a u onim gde pupoljci nisu primljeni, vrši se ponovna okulizacija. Oko dve nedelje nakon okulizacije, pregledaju se vezice. One koje su se usekle u koru se olabave.

U voćnjacima

Nastavlja se rad na savijanju strukturnih grana pri formiranju stabala palmete.

Putem navodnjavanja održava se vlažnost zemljišta iznad 70% poljskog vodnog kapaciteta.

Pomoću diska, kultivatora, rotacionog freza i rotacionog freza sa ofsetnim delom, površina zemljišta u međuredovima i u redovima se održava obrađenom i bez korova.



Nastavlja se berba slatkih i kiselih trešanja, a počinje i masovna berba kajsija i bresaka.

U zasadima jagode

Nastavlja se nega navodnjavanja novoosnovanih zasada jagode, posebno onih zasađenih u junu. U nižim i toplijim predelima, gde je berba ploda završena, slama se skuplja, uklanja i spaljuje.



Berba ploda se nastavlja na višim i hladnijim lokalitetima.

Nakon uklanjanja slame, zasadi se zalivaju i obrađuju, nakon što su prethodno prihranjene sa 10-12 kg amonijum-nitrata po aru.

Matični zasadi namenjeni za proizvodnju sadnog materijala se zalivaju, prihranjuju sa 15-20 kg amonijum-nitrata po aru i okopavaju. Izbojci u zasadima odakle se ne uzima sadni materijal se odstranjuju.

Označavaju se i pripremaju nove površine za zasade jagode za jesenju sadnju na otvorenom polju. Pre duboke obrade, površina se đubri sa 2-4 t stajnjaka, 60-80 kg superfosfata i 20-30 kg kalijum-sulfata po aru.

U zasadima maline

Nastavlja se nega navodnjavanja i obrade novih zasada. Rodni zasadi se zalivaju i obrađuju. Norma zalivanja je 50-60 dm³ po aru.



Sprovodi se masovna berba ploda.

Vodi se računa o matičnim zasadima maline – navodnjavanje i obrada, kako bi se obezbedila maksimalna količina sadnog materijala – izdanaka.

Zasadi se pregledaju, odstranjuju se atipične biljke drugih sorti, a stare, otplodile izdanke se seku, skupljaju i spaljuju.

U zasadima crne ribizle

Nastavlja se nega lejišta za ukorenjavanje. Zemljište se zaliva i obrađuje, a u mladim i rodним zasadima ne dozvoljava se zakorovljenost.

Zasadi se prihranjuju azotom (1/3 godišnje norme).

Sprovodi se masovna berba ploda. Tokom berbe, atipične biljke drugih sorti se obeležavaju za kasnije iskorenjivanje, kao i bolesne i slabe biljke. Nakon berbe, uklanjaju se slomljene, nerazvijene i suvišne izbojke.

U zasadima drugih useva

Obeležavaju se željene sorte i forme smokvi za dobijanje reznica. Uzimaju se reznice aktinidije, lovora, crne aronije, morske bucke i nara za ukorenjavanje u stakleniku sa veštačkom maglom. Reznice se pripremaju i tretiraju rastvorom indolbuterne kiseline 5 sekundi. Ukorenjuju se u staklenicima sa veštačkom maglom u supstratu od dva dela perlit i jedan deo treseta.

Počinje okulizacija podloga kavkaske persimone sortama persimone i okulizacija sadnica aktinidije gajenim sortama.

Nastavlja se vezivanje izdanaka aktinidije za žičanu konstrukciju. Sprovodi se letnja rezidba aktinidije. Žičana konstrukcija se postavlja već pri sadnji, a žice se podižu na 1-1,20 m i 1,80-2 m iznad površine zemljišta.

Okuliziraju se žižula i pistacija.

Beru se plodovi smokve, a krajem meseca počinje berba plodova morske bucke i crne aronije.