

Октобар – падавине од агрономског значаја и добри услови за развој озиме уљане репице

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 06.10.2024 Брой: 10/2024



U oktobru će agrometeorološke uslove određivati temperature oko i iznad klimatskih normi, kao i padavine blizu mesečnih proseka. Nakon letnje suše, ekonomski značajne padavine u septembru, u pojedinim područjima Istočne i mestimično Zapadne Bugarske, poboljšale su vlažnost gornjih slojeva zemljišta i uslove za izvođenje sezonskih obrada zemljišta.

Padavine krajem septembra bile su neravnomerno raspoređene. Na mnogim mestima u Centralnoj i Severoistočnoj Bugarskoj zabeležene su padavine do i preko 30-35 l/m² (Veliko Trnovo - 40 l/m², Ruse - 43 l/m²,

Razgrad - 36 l/m², Silistra - 45 l/m², Varna - 45 l/m², Dobrič - 53 l/m²), što je dovelo do značajnog poboljšanja zaliha vlage u gornjim slojevima zemljišta i uslova za sprovođenje sezonskih obrada zemljišta. Za razliku od centralnih i istočnih regiona, u delovima Zapadne i Južne Bugarske padavine na početku jeseni nisu imale ekonomski značaj. U tim delovima zemlje, suvo i zbijeno zemljište ozbiljno otežava duboko oranje i predsetvene pripreme površina predviđenih za setvu ozimih useva.

Tokom većine dana prve dekade oktobra ne predviđaju se značajne padavine i uslovi će omogućiti pripremu polja i njihovu setvu ozimim žitima. Letnja suša je ometala pravovremenu setvu ozime uljane repice i, mestimično u ratarskim regionima Centralne Bugarske, površine će biti posejane van agrotehničkog roka. Veoma je verovatno da kasno posejani usevi neće ući u fazu rozete tokom svoje jesenje vegetacije, što garantuje uspešno prezimljavanje useva bez oštećenja.

U oktobru se odvijaju optimalni agrotehnički rokovi za setvu ozimih žita. Rok za Severnu Bugarsku je tokom prve polovine meseca, za Južnu Bugarsku tokom druge polovine meseca, a za regiona Crnog mora tokom treće dekade. Očekivane padavine krajem prve i početkom druge dekade, kao i tokom druge polovine treće dekade meseca, biće od značajnog uticaja za normalan tok početnih faza vegetacije pšenice i ječma. U oktobru, u zavisnosti od vremena setve, kod pšenice će se zapažati sledeće faze – nicanje, prvi i treći list.



Predviđeno toplo vreme u drugoj polovini meseca biće preduslov za povećanje populacije obične voluharice. Polja sa jesenje posejanim usevima moraju se nadzirati, a kada se dostigne prag ekonomske štete – PŠ: 2

aktivne kolonije/jutro – potrebno je izvršiti tretman.

Uslovi za terenske radove postojaće sredinom druge i tokom prve polovine treće dekade, kada se predviđa relativno suvo vreme.



U oktobru, u voćnjacima jabuke i kruške zahvaćenim strupom, u cilju smanjenja infekcije, preporučljivo je na početku opadanja lišća, nakon branja plodova, izvršiti tretman sa 5% rastvorom uree.

Za koštuničave voćke, nakon masovnog opadanja lišća, preporučuje se prskanje sa 2% bordoskom mešavinom protiv uzročnika rupičavosti lišća, rane smeđe truleži i uvijanja lišća breskve.

Početkom oktobra predviđeni su prizemni mrazevi, koji će ograničiti mogućnosti za dodatnu proizvodnju od kasnih povrtarskih kultura osetljivih na oštećenja od mraza.

Izvor: NIMH