

Активности заштите биља у воћњаку у октобру

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 08.10.2024 Брой: 10/2024



Početkom oktobra predviđeni su mrazevi.

U oktobru, u zasadima jabuka i krušaka zahvaćenim parom, u cilju smanjenja infekcije, preporučuje se, na početku opadanja lišća i posle branja plodova, izvršiti tretman 5% rastvorom uree.

Za koštuničave voćke, posle masovnog opadanja lišća, preporučuje se prskanje 2% bordoškom smešom protiv prouzrokovача rupičavosti lišća, rane smeде truleži i kovrdžavosti lišća breskve.

U voćnjacima

Na voćnim drvećem postavljaju se kutije za gnežđenje i hranilice kako bi se privukle korisne ptice.

Korugirane kartonske trake sa prisutnim gusenicama jabukove smotuljke, šljivine smotuljke i orahove smotuljke sakupljaju se i postavljaju u viseće kaveze u voćnjacima – detlići i druge ptice uništavaju gusenice u trakama.



Na deblu svakog drveta u voćnjacima zaraženim zimskim moljcem, postavlja se jedna lepljiva traka na visini od 20–100 cm. Trake su napravljene od papira širine 20 cm, sa gornjim i donjim ivicama povezanim. Za premazivanje se koristi lepak koji se sporo suši. Da bi se sprečilo kukcima da se sakriju pre nego što stignu do trake, ispucala kora od trake nadole do površine zemlje se unapred oguli.

Plodovi jabuke i kruške pregledavaju se na mestima za sortiranje i rukovanje na prisustvo kalifornijske štitaste vaši i dudove štitaste vaši u nezaraženim područjima.



Gnezda gusenica američke bele leptirice se broje kako bi se utvrdila gustina populacije štetočine.



Drndanje drveća, započeto krajem septembra, se nastavlja kako bi se utvrdila gustina populacije krušinog pupoljka. Kada gustina pređe ekonomski prag, pre polaganja jaja, drveće se prska kontaktnim insekticidom iz

bilo koje grupe – Decis 100 EC (12.25 ml/da) ili drugim proizvodom na bazi deltametrina, Sumi Alpha 5 EC (0.03%), Karate Zeon 5 SC (15 ml/da), Lamdex extra (100–120 g/da) i drugi.

Zasadi krušaka se prskaju protiv krušine buve sa jednim od insekticida – Bermectin (40–120 ml/da) ili drugim proizvodom na bazi abamektina, Voliam Targo 063 SC (75 ml/da), Imidan 50 WG (150 g/da), Delegate 250 WG (30 g/da), Dekka EC (50 ml/da) ili drugim proizvodom na bazi deltametrina, Movento 100 SC (0.12–0.15%), Naturalis (100–200 ml/da), Sineis 480 SC (30–44 ml/da), Flipper (1–2 l/da).



Izdanci sa vunastom jabukovom vaši parazitiranom od strane parazitoidne ose *Aphelinus mali* se seku i čuvaju na hladnom mestu i u hladu pod zaklonom. Vunaste jabukove vaši koje sadrže ovu osu su crne boje i nemaju otvor za izlazak. U proleće sledeće godine, koriste se za biološku kontrolu.