

# Неравномерно распоређене падавине у земљи воде до разлика у фенолошком стању озимих житарица

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 20.11.2024 Брой: 11/2024



Do kraja druge i početkom treće dekade novembra, oni će biti određeni prosečnim dnevnim temperaturama iznad klimatskih normi i iznad biološkog minimuma neophodnog za vegetaciju ozimih žitara.

Tokom perioda, ne očekuju se značajne padavine i promene u nivou zaliha jesenje vlage u zemljištu. Padavine koje su pale u proteklom periodu bile su neravnomerno raspoređene. Na mnogim mestima u severozapadnim regionima, u Gornjotračkoj ravnici i u krajnjim južnim delovima zemlje, zabeležene su padavine ispod 10-12 l/m<sup>2</sup> – potpuno nedovoljne da prevaziđu deficit vlage kod ozimih žitara.

U nekim od istočnih regiona (Razgrad, Ruse, Silistra, Sliven, Karnobat) desile su se značajne padavine – iznad 25-30 l/m<sup>2</sup>. U ovim regionima došlo je do poboljšanja zaliha vlage u zemljištu u gornjim slojevima zemljišta i u uslovima za vegetaciju jesenje setih useva.

Dok su u zemlji oktobar i početak novembra bili periodi suše i nedostatka poljoprivredno efektivnih padavina, u regionu Dobriča primećuju se dovoljne zalihe vlage u zemljištu, koje doprinose dobrom razvoju useva pšenice. Temperature omogućavaju normalno nicanje tamo gde je vlaga dovoljna. Niže temperature u Dobrudži štite jesenje sete useve od napada štetočina, kao što su mušice žitara i lisne vaši.

Tokom perioda, kod pšenice će se moći uočiti različiti stadijumi – klijanje, nicanje (agrometeorološke stanice: Kneža, Nikolaevo, Kazanlak, Plovdiv, Haskovo, Jambol) i formiranje 1.–2. i 3. lista (Novočene). Razlike u fenološkom stanju ozimih žitara posledica su produžene jesenje suše i odložene setve.

Tokom perioda, uslovi će biti pogodni za sadnju voćaka i za sprovođenje fitosanitarnih mera u voćnim zasadima.

*Izvor: RHMZ*