

Kako da izvršimo sadnju vinove loze

Автор(и): Институт по лозарство и винарство – Плевен

Дата: 24.11.2024 Брой: 11/2024



Vreme sadnje

Sadnja vinove loze se može izvesti u jesen i u proleće. Utvrđeno je da jesenja sadnja obezbeđuje veći procenat prijema i jači rast loza tokom prve godine. Prolećna sadnja se smatra češćom praksom u našoj zemlji. Najbolje se izvodi u drugoj polovini marta i početkom aprila, čim rad u polju postane moguć.

Priprema loze za sadnju

Pre sadnje, korenje loza se potapa u vodu jedan do dva dana kako bi se osvežilo. Ova operacija je obavezna kada se sadnja vrši u proleće. Priprema loza za sadnju vrši se na sledeći način:

- čuvaju se svi dobro razvijeni korenovi koji se nalaze u osnovi podloge;
- korenovi se podrežu na dužinu od 6 do 8 cm;
- povređeni i oštećeni korenovi se uklanjaju do zdravog tkiva;
- svi korenovi koji su se razvili iz gornjih čvorova uklanjaju se do osnove;
- izdanak koji se razvio iz kalema se skraćuje na 2 vidljiva pupa (oka);
- ako je izniklo više izdanaka, bira se jači sa boljim položajem, a ostali se uklanjaju;

Ako nije moguće odmah posaditi kupljene loze, mogu se privremeno čuvati u podrumu na temperaturi koja ne pada ispod 0°C. Korenski sistem se prekrije vlažnim, čistim rečnim peskom, koji se mora povremeno vlažiti. Ako pesak nije dostupan, korenovi se mogu prekriti vlažnim zemljištem.

Metode sadnje

Sadnja vinove loze može se izvesti na nekoliko načina: u sadne jame, sadilicom (diblerom), hidro-bušilicom, otvaranjem brazdi, sadnom mašinom itd.

Sadnja u jame je najrasprostranjeniji metod u našoj zemlji. On obezbeđuje veoma dobar prijem loza. Kopanje sadnih jama vrši se na sledeći način:

Priprema loze za sadnju



Фиг. 1. Лоза с развити повече от един латораст



2.1. лозата преди подрязване



2.2. лозата, след като е подготвена за засаждане

Priprema loze za sadnju

Sl. 1 Loza sa više od jednog razvijenog izdanka

2.1. loza pre podrezivanja

2.2. loza nakon što je pripremljena za sadnju

- sadna jama se kopa na mestu obeleženom marker žicom, pomoću ašova, do dubine od 40 cm i širine 25–30 cm;
- na dno sadne jame poželjno je uneti 1–2 kg dobro izgnojenog stajskog đubriva, prethodno pomešanog sa rastresitim zemljištem;
- mlada loza se postavlja u sadnu jamu tako da korenovi leže na prethodno pripremljenom dnu jame;
- jama se zatrpa zemljom do svoje polovine, koja se zatim čvrsto zbije, nakon čega se u jamu aplicira 5–6 litara vode;
- nakon što se voda upije, jama se zatrpa zemljom do gornje ivice i ponovo dobro zbije;

- marker se zabija u zemljište tik uz lozu kako bi se označila lokacija okca (pupoljka) posađene loze;
- važno je da, prilikom postavljanja loze u jamu, mesto kalemljenja bude na nivou površine zemljišta;
- preko posađene loze formira se humak od rastresitog zemljišta, koji u slučaju prolećne sadnje prekriva okce slojem zemlje od 5–6 cm, a u slučaju jesenje sadnje – od 25–30 cm;



Sadnja u jamu

Nege loza nakon sadnje

- Obavezno je zahtev da se tokom vegetacionog perioda humci ne otkrivaju. Na težim zemljištima, pesak se može posuti direktno oko okca, ili se humak može odozgo posuti peskom kako bi se sprečilo stvaranje debore kore.
- Tokom vegetacionog perioda novi izdanci izbijaju kroz formirani zemljani humak. Kada se na humaku nakon kiše formira kora, ona se rahlja, a kada se slegne, obnavlja se.
- Kada izdanci dostignu 25–30 cm, humci se otvaraju i adventivni korenovi se uklanjaju, nakon čega se humci ponovo obnavljaju.
- Gde je potrebno, vrši se mehanička ili hemijska suzbijanja žičara i hrčaka.
- Mladim lozama se ne vrši vadenje izdanaka iz pazuha (pazuharstvo), prštiranje ili proređivanje pupoljaka, jer smanjenje lisne površine ih slabi.
- Početkom septembra humci se otvaraju kako bi se osnova izdanka omogorila, i ponovo se obnavljaju pre nastupa hladnog vremena.
- Poželjno je da se podrezivanje jednogodišnjih loza izvede u proleće druge godine.