

Početkom decembra, očekivane padavine će povećati zalihe vlage u gornjim slojevima zemljišta.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.12.2024 Брой: 12/2024



Tokom naredne sedmodnevne periode, agrometeorološki uslovi će doživeti značajnu promenu. U zapadnoj Bugarskoj predviđa se značajan pad temperatura, ali bez kritičnih minimalnih vrednosti za jesenske useve koji zaostaju u svom razvoju. Hladnoća na početku decembra dovesti će do usporavanja, a na višim poljima, gde se očekuje formiranje snežnog pokrivača, do prestanka vegetacionih procesa kod ozimih žitarica.

U većini istočnih i južnih regiona, predviđene prosečne dnevne temperature biće bliske biološkom minimumu neophodnom za razvoj ozimih žitarica. Uslovi za vegetaciju kod jesenjih useva razvijaće se u regionima duž

crnomorske obale, gde se predviđaju više temperature.

Očekivane padavine tokom perioda povećaće rezerve vlage u zemljištu u gornjim slojevima zemljišta. Ove padavine će biti zakasnele za deo useva na nekim mestima u centralnim i južnim regionima, gde, zbog deficita vlage u zemljištu, proklijale ozime žitarice nisu nikle. Kao rezultat produžene jesenje suše, veliki deo ozimih žitarica je slabo uspostavljen, u početnoj fazi razvoja, i usevi su neujednačene gustine. Na početku decembra, kod pšenice će se uočiti sledeće faze: nicanje, 1–2 i 3 lista. Mali deo useva u severoistočnim regionima, gde vlaga tokom prve polovine jeseni nije bila ograničavajući faktor, nalazi se u fazi busanja (region Provadije) – odgovarajućoj fazi za prezimljavanje.

Tokom perioda, povoljniji uslovi za sadnju voćaka nastati će u istočnim regionima zemlje.

Izvor NIMH