

децембар – температуре близу климатских норма и падавине од пољопривредног значаја

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 07.12.2024 Брой: 12/2024



Početak decembra predviđa se značajno sniženje temperatura, što će dovesti do usporavanja i prestanka vegetacije u jesenjim usevima u većini ratarskih regiona zemlje.

U Istočnoj Bugarskoj, gde će maksimalne vrednosti dostići 15-16°C, stvoriće se uslovi za kratkotrajnu aktivaciju vegetacije u jesenjim usevima, ali se ne očekuje značajna promena u fenološkom stanju ozimih žitarica.

Početak meseca, kao rezultat produžene jesenje suše, veliki deo useva pšenice će prekinuti vegetaciju nedovoljno razvijen, u početnoj fazi rasta. Kod ozimih žitarica dominiraju faze nicanja i početnog formiranja

listova (1-2 lista), što postavlja pitanja u vezi sa njihovom uspešnom prezimljavanju. Mali deo useva u severoistočnim regionima (Targovište, Silistra, Provadija), gde vlaga tokom prve polovine jeseni nije bila ograničavajući faktor, nalazi se u fazi trećeg lista i na početku klasanja (region Provadije) – što je odgovarajuća faza za prezimljavanje.

Do kraja prvog i tokom većine dana drugog i trećeg dekada, predviđene temperature, bliske klimatskim normama, održavaće poljoprivredne useve u fazi mirovanja tokom prezimljavanja. Tokom meseca predviđaju se minimalne temperature do minus 10°C koje će, u odsustvu snežnog pokrivača i uz duže zadržavanje, biti kritične za nedovoljno razvijene ozime žitarice u fazama nicanja i početnog formiranja listova.

Očekivane padavine u decembru, oko mesečne norme, povećaće rezerve vlage u zemljištu u slojevima od 50 i 100 cm.

Padavine koje su pale početkom decembra premašile su 30-40l/m² na mnogim mestima u Centralnoj i Južnoj Bugarskoj (Loveč - 33l/m², Blagoevgrad - 41l/m², Sandanski - 42l/m², Plovdiv - 42l/m², Haskovo - 41l/m², Kardžali - 50l/m², Čirpan - 39l/m²), što je dovelo do prevazilaženja deficita vlage za jesenje useve u gornjim slojevima zemljišta. Tokom narednog perioda očekuju se dalje poljoprivredno značajne padavine, kao i povećanje nivoa rezervi vlage u zemljištu u slojevima od 50cm i 100cm.

Izvor: NIMH