

Početkom marta, padavine i sneg će povećati nivo zaliha vlage u zemljištu.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.03.2025 Брой: 3/2025



Niske minimalne temperature zabeležene tokom protekle sedmodnevne nedelje, na pojedinim mestima u severozapadnoj Bugarskoj i u visokim dolinskim poljima do i ispod minus 13-14°C u Vidinu, Kneži, Dragomanu i Kazanlaku, stavile su na kušnju otpornost na hladnoću nedovoljno razvijenih jesenjih useva u uslovima bez snežnog pokrivača. Vrednosti ovog reda veličine, kada se zadrže duži vremenski period, kritične su za prezimljavanje ozimih žitavnica u fazi 2-3 lista.

U severozapadnim regionima predstoje terenski pregledi useva na agrometeorološkim stanicama Bážovec, Kneža, Kyustendil i Kazanlak zbog mogućih oštećenja od mraza.

Izuzetno niske temperature tokom poslednje nedelje februara imale su razoran uticaj na voćnjake u regionu Ruse–Silistra. Na nekim mestima temperature su pale na minus 24 stepena, usled čega je veliki deo plodnih pupoljaka kajsija smrznut, deli Nikolaj Kolev – predsednik Saveza dunavskih voćara – Ruse. Oštećenja od mraza primećena su i kod trešnje, breskve, šljive, jabuke i kruške.

Krajem februara i početkom marta temperature će biti ispod klimatskih normi, što će održati stanje mirovanja kod jesenje posejanih useva. Predviđene minimalne vrednosti su iznad kritičnih pragova za prezimljavanje poljoprivrednih useva.

Očekivane padavine u vidu kiše i snega povećaće nivo rezervi vlage u zemljištu u sloju od 50 cm. Kao rezultat padavina ispod normale u januaru i prvoj polovini februara, rezerve vlage u zemljištu u sloju od 100 cm u većem delu zemlje su nezadovoljavajuće za ovaj period godine. Predviđena je povećana verovatnoća formiranja snežnog pokrivača i poboljšanja uslova za prezimljavanje jesenje posejanih useva krajem naredne nedelje.

Izvor: NIMH