

# У марту, температуре ће бити око и изнад климатских норма, а падавине око и испод норма.

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 09.03.2025 Брой: 3/2025



Tokom prve polovine prve dekade, prognozirane temperature biće u okvirima koji će kočiti razvoj poljoprivrednih useva.

Tokom druge polovine dekade, očekuje se značajan porast temperatura i njihove srednje dnevne vrednosti će dostići i premašiti biološki minimum neophodan za nastavak vegetativnih procesa kod ozimih žitatica.

Prognozirane temperature iznad normale tokom druge dekade marta podstakaće vegetaciju jesenje posejanih useva. U ovom periodu, deo useva pšenice i ječma koji se trenutno nalaze u fazi trećeg lista preći će u fazu

busanja.

Očekivane maksimalne temperature do i preko 20°C takođe će aktivirati vegetativne procese kod većeg dela višegodišnjih useva. Kod voćaka, faze bubrenja i pucanja pupoljaka odvijace se kod ranocvetajućih koštičavih vrsta (badem, kajsija, breskva). U vinogradima u poljskim predelima, primećivace se tok soka.

Uslovi tokom perioda biće pogodni za prihranjivanje ozimih useva azotnim mineralnim đubrivima, za izvođenje predsetvene obrade zemljišta i setvu ranih prolećnih useva (grahorica, grašak, jari ječam).

Na početku druge dekade marta, ne očekuju se padavine, što će pružiti priliku za blagovremeno sprovođenje preventivnog prskanja pre cvetanja u voćnjacima fungicidima na bazi bakra protiv uzročnika paleži cvetova, kovrdžavosti lista breskve, parši i drugih patogena.

Tokom treće dekade, očekivane temperature, oko i iznad klimatskih normi, održavace aktivne vegetativne procese kod poljoprivrednih useva. Krajem meseca, kod ozimih žitatica koje su izbusalje u jesen, primećivace se porast koeficijenta busanja.

U martu, kod voćaka, odvijace se faze bubrenja i pucanja pupoljaka. Krajem meseca, kod ranocvetajućih vrsta – badema, kajsije i breskve – primećivace se faza cvetnih pupoljaka, a na pojedinim lokalitetima u južnim regionima – početak cvetanja. U vinogradima u poljskim predelima, primećivace se tok soka.

*Tokom meseca, prognozirane minimalne temperature, do minus 7°C, predstavljace rizik za voćke u fazi pupoljaka i cvetanja.*

Padavine u martu povećace rezerve vlage u zemljištu u sloju od 100 cm. Krajem februara, u većem delu zemlje, sa izuzetkom pojedinih mesta u istočnim regionima, nivo rezervi vlage u zemljištu za ozime žitarice u jednometarskom sloju je nizak za ovu godišnju dob – u delovima Podunavske ravnice i južnih regiona ispod 70% poljskog vodnog kapaciteta (PVK). Obično, krajem zime, u godinama bez klimatskih anomalija, rezerve vlage u zemljištu u jednometarskom sloju dostižu nivoe do PVK.

U martu, pogodniji uslovi za izvođenje predsetvene obrade površina predviđenih za setvu ranih i srednje ranih prolećnih useva javiace se tokom druge polovine meseca. Sredinom marta, počinje agrotehnički rok (15-20.03) za setvu suncokreta u Južnoj Bugarskoj, a sredinom treće dekade (25.03–5.04) – u Podunavskoj ravnici.

*Izvor: NIMH*