

Април – нестабилно време и падавине од пољопривредног значаја

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.04.2025 Брой: 4/2025



U aprilu će se agrometeorološki uslovi odlikovati povećanom dinamikom. Tokom većine dana u mesecu, oni će biti određeni nestabilnim vremenskim prilikama. Očekivane padavine, oko i iznad klimatskih normi, održavaće dobre rezerve vlage u zemljištu u sloju od 50 cm i uslove za vegetaciju ozimih žitarica i posejanih jarih useva. To je navedeno u mesečnoj prognozi agrometeorologa sa NIMH-a.

Tokom prve polovine aprila, vegetacija poljoprivrednih useva će se odvijati pri prosečnim dnevnim temperaturama oko i ispod klimatskih normi. U prvoj dekadi, pšenica na terenima će ući u fazu izdizanja stabiljike.

Tokom druge dekade, prognoziraju se negativne minimalne temperature do minus 2-3°C, sa povećanim rizikom od oštećenja cvetova i mladih plodova voćaka. Poslednji prolećni mrazevi se očekuju krajem dekade, što treba uzeti u obzir pri kaljenju rasada povrća.

Septorioze kod ozime pšenice

Povećanje prosečnih dnevnih temperatura i ubrzanje razvojnih faza poljoprivrednih useva prognozira se krajem druge i tokom treće dekade. U ovom periodu, pšenica će preći iz faze izdizanja stabiljike u fazu klasanja i same faze klasanja. Interfazni period izdizanje stabiljike – klasanje je kritičan za infekciju ozimih žitarica septoriozom lista.



Zasнове пшенице такође треба пратити на присуство штеточина – житне златарике, штитастог смрдљивца, а при густини изнад економског прага штетности, неопходна је правовремена заштита.



Paršav jabuke

Česte padavine tokom meseca stvoriće uslove za povećanje infektionog fonda brojnih gljivičnih oboljenja kod voćaka – palež cvetova (rana smeđa trulež), paršav, rupičavost lista, kovrdžavost lista breskve, itd. Tokom prve polovine treće dekade, prognozira se povećana verovatnoća oluja sa gradom. Voćke oštećene gradom treba tretirati fungicidima na bazi bakra pri prvoj prilici kako bi se ograničio rizik od sekundarnih infekcija patogenima.

U aprilu, pogodniji uslovi za izvođenje tretmana zaštite biljaka javiće se na početku i kraju druge dekade i tokom druge polovine treće dekade.

Početkom treće dekade, temperatura zemljišta u sloju od 10 cm dostići će pogodne vrednosti za setvu kukuruza, a krajem aprila – i za toploljubive jaruseve (pamuk, pasulj, kikiriki, lubenice, dinje, itd.).