

Током другог десетодневља априла, предвиђа се пораст температура и побољшање услова за развој пољопривредних усева.

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 11.04.2025 Брой: 4/2025



Nesezonski hladno vreme tokom proteklog perioda, sa minimalnim temperaturama ispod nule i padavinama snega, nanelo je nepopravljivu štetu voćnim stabljikama i usevima uljane repice koji su ušli u fazu cvetanja, prema agrometeorolozima. Agronomi će uskoro izvršiti preglede gazdinstava kako bi utvrdili štetu na voćnim vrstama i drugim poljoprivrednim usevima.

Prvi talas hladnoće početkom meseca ozbiljno je pogodio proizvođače kajsije u regionu Silistre. Uprkos šteti izazvanoj zimskim uslovima u zemlji, sorta „Silistrenska Kompotna“ je sačuvala svoje cvetove i očekuje se da će roditi.

Kajsija „Silistrenska Kompotna“ je glavna standardna sorta stvorena na eksperimentalnoj stanici u gradu Silistri 1964. godine ukrštanjem mađarske kajsije sa sortom Krasnoshchekiy. Drvo je umereno bujno sa globularnom krošnjom. Cvetanje je srednje-kasno; radi se o samooprašujućoj sorti.

Tokom narednog sedmodnevnog perioda, agrometeorološki uslovi će doživeti značajnu promenu. Početkom druge dekade aprila, predviđa se porast temperatura i poboljšanje uslova za razvoj poljoprivrednih useva.

U većini dana perioda, vegetacija ozimih žitatica će se odvijati umerenim tempom, pri prosečnim dnevnim temperaturama bliskim klimatskim normama za drugu dekadu aprila.

Rasprostranjene padavine tokom prve dekade, koje su u nekim ratarskim područjima premašile 40 - 50 l/m², a mestimično u južnoj Bugarskoj dostigle i norme za april (Plovdiv - 57 l/m², Haskovo – 58 l/m², Kardzhali – 57 l/m², Chirpan – 56 l/m²), drastično su poboljšale rezerve vlage u zemljištu, što je od velikog značaja za normalan tok vegetacionih procesa kod ozimih žitatica i posejanih jarih useva.

Krajem perioda, kod velikog dela useva pšenice primećivaće se faza izdizanja stabila, tokom koje biljke povećavaju svoje zahteve za vlagom u zemljištu. Kod useva suncokreta posejanih početkom proleća, dominiraće faza nicanja.

Očekivane padavine tokom perioda održavaće visok sadržaj vlage u gornjim slojevima zemljišta, što će odložiti setvu suncokreta van preporučenih agrotehničkih rokova.

Tokom druge dekade aprila, potrebno je pratiti ozime žitarice na prisustvo bolesti i štetočina: pepelnica, septorioza lisnih plamova, zlatooka, pšenični trips, štitasta stenica, itd., i ukoliko njihov broj pređe ekonomski prag štetnosti, neophodna je pravovremena zaštita.