

Током последње недеље маја развој пољопривредних усева ће се одвијати при температурама испод климатских норма и привредним падавинама.

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 26.05.2025 *Број:* 5/2025



Tokom naredne sedmodnevne periode agrometeorološki uslovi će i dalje biti određeni nestabilnim vremenom. Tokom perioda predviđaju se padavine agronomskog značaja, kao i poboljšanje rezervi vlage u zemljištu čak i u dubljim slojevima zemljišta.

Padavine tokom prve i druge dekade maja bile su neravnomerno raspoređene. Na mnogim mestima u južnoj Bugarskoj majske padavine su dostigle i premašile mesečne norme (Blagoevgrad, Haskovo, Kardžali, Elhovo, Čirpan, Karnobat, Burgas). U delu južnih regiona rezerve vlage u zemljištu u slojevima od 50 i 100 cm dostigle su nivo do i iznad 85% poljskog vodnog kapaciteta (PVK), optimalan za razvoj ozimih žitarica i posejanih jarih useva.

Za razliku od južnih regiona, na mestima u severoistočnoj Bugarskoj (agrometeorološka stanica Silistra), kao rezultat padavina ispod normale u aprilu i prvoj polovini maja, nivo rezervi vlage u zemljištu za ozime žitarice na kraju druge dekade je nizak – ispod 65% PVK.

Tokom poslednje nedelje maja očekuje se značajno poboljšanje rezervi vlage u zemljištu u severoistočnim regionima, što je od velikog značaja za ozime žitarice, koje imaju visoke zahteve prema vlažnosti zemljišta.

Tokom perioda, razvoj poljoprivrednih useva će se odvijati na temperaturama ispod klimatskih normi. Do kraja maja, kod ozimih žitarica će se odvijati formiranje zrna i nalivanje zrna.



Tokom ovog interfaznog perioda, štetu na pšenici nanose larve štitastog smrdljivca, što zahteva terenski pregled useva, a kada gustina štetočina pređe prag ekonomske štete (2 larve/m²), treba izvršiti tretman pri prvoj prilici.

Kod suncokreta i kukuruza, odvijaće se formiranje listova.

Krajem maja, kod vinove loze će dominirati cvetanje cvetnih grozdova, kritična faza za infekciju plamenjačom i pepelnicom.

Tokom poslednje nedelje maja, povećani sadržaj vlage u gornjim slojevima zemljišta ograničiće izvođenje sezonskih obrada zemljišta. Tokom perioda očekuje se grad. Za voćke, povrtarske kulture i vinograde pogođene

gradom, preporučljivo je izvršiti tretmane fungicidima koji sadrže bakar kako bi se smanjio rizik od sekundarnih infekcija patogenima.

Izvor: NIMH