


Метеоролошки услови током јуна ће одржати повишен инфективни фон гљивичних патогена код воћних, повртарских усева и винограда

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 06.06.2025 Брой: 6/2025



Većinu dana u junu, agrometeorološki uslovi će biti određeni temperaturama iznad klimatskih normi i padavinama oko i ispod mesečne norme.

Početak juna, predviđa se značajan porast temperatura i ubrzanje razvojnih faza poljoprivrednih useva. Meteorološki uslovi će biti određeni temperaturama iznad normale, koje će održavati ubrzane razvojne faze u poljoprivrednim usevima. Početkom meseca, očekuju se visoke maksimalne temperature u ratarskim

područjima, mestimično do 35-36°C, što će, u kombinaciji sa niskom vlažnošću vazduha, negativno uticati na cvetanje, oplodnju i formiranje reproduktivnih organa kod povrtarskih kultura iz ranog ratarskog proizvoda (pasulj, paradajz, paprika, krastavci, tikvice, itd.).



Predviđeno vruće i relativno suvo vreme tokom većine dana u periodu biće preduslov za povećanje populacija grinja.

Zaštitno tretiranje biljaka od bolesti i štetočina treba sprovoditi tokom hladnijih sati u danu, na temperaturama ispod 25°C.

Očekivane padavine tokom druge polovine prve dekade održavaće dobre rezerve vlage u slojevima zemljišta od 50 cm i 100 cm.

Obilne padavine krajem maja poboljšale su rezerve vlage u zemljištu i u većini ratarskih područja dostigle su nivo do i iznad 85% poljskog vodnog kapaciteta. Prisustvo dobrih rezervi vlage u zemljištu tokom prve dekade juna imaće povoljan uticaj na prolećne useve i na useve pšenice, u kojima će se odvijati nalivanje zrna i faza mlečne zrelosti. Krajem dekade, kod ječma u nekim od istočnih i južnih regiona (Targovište, Provalija, Karnobat), primećivaće se i faza voskaste zrelosti.

Predviđeni termički uslovi iznad normale tokom druge dekade takođe će ubrzati procese sazrevanja ozimih žitnih useva. Tokom ovog perioda, kod pšenice u ratarskim područjima, odviјаće se prelazak iz mlečne u voskastu i punu voskastu zrelost.

Tokom treće dekade, razvoj poljoprivrednih useva odviјаće se na temperaturama bliskim klimatskim normama. Krajem dekade, kod suncokreta posejanog u agrotehničkom roku, primećivaće se početak faze cvetanja. Kod ranih hibrida kukuruza, odviјаće se faza metličanja i cvetanja metlice.



Prašnasta plesan se retko sreće u objektima za gajenje. Tipična je za regione koje karakteriše niska vlažnost vazduha. Na listovima se formiraju belkaste do žućkaste mrlje nepravilnog oblika. Sa donje strane prekrivene su retkim belim prevlakom koji formira sporulacija gljive. U slučajevima jake zaraze, mrlje se spajaju i list se sparušuje. Gljiva napada samo listove biljaka. Optimalni uslovi za njen razvoj su temperature iznad 25°C i vlažnost ispod 60%. Poslednjih godina, identifikovana je nova vrsta koja napada samo paradajz u zaštićenom prostoru i njeni zahtevi za uslove spoljne sredine su drugačiji.

Meteorološki uslovi u junu održavaće povećanu infektivnu pozadinu gljivičnih patogena: kasnu smeđu trulež na voćnim drvetima, plamenjače na povrtarskim kulturama i vinovoj lozi. Kod vinove loze, interfazni period od cvetanja cvatova do zametanja ploda (bobice veličine graška) je kritičan za zarazu plamenjačom i pepelnicom. Tokom meseca, na vinovoj lozi treba nastaviti tretmane protiv grozdane savijače, a u voćnjacima – protiv

jabukove savijače, miniraca i lisnih vaši. Pogodniji uslovi za sprovođenje zaštitnih tretmana biljaka stvoriće se tokom prve polovine prve i tokom većine dana druge dekade.