


Ограничавајући фактор за развој касних пољопривредних усева у августу остаје дефицит влаге у земљишту.

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 05.08.2025 Брой: 8/2025



U avgustu će agrometeorološke uslove određivati temperature iznad klimatskih normi i padavine – oko i ispod mesečne norme. Deficit vlage u zemljištu će i u avgustu ostati ograničavajući faktor za razvoj kasnih ratarskih useva.

Padavine koje su pale krajem jula, nakon produbljene suše, bile su lokalne i nedovoljne da prevladaju deficit vlage kod kasnih ratarskih useva. U većini ratarskih regiona, produktivna vlaga je odsutna u slojevima zemljišta od 50 i 100 cm.

Tokom većeg broja dana u avgustu, predviđeno relativno suho vreme zahtevaće primenu povećanih norma navodnjavanja za druge useve i kasne hibride kukuruza. Povećane norme navodnjavanja biće potrebne i za voćke, koje su u procesu formiranja cvetnih pupoljaka za narednu godinu.

Nova generacija hibrida suncokreta iz DAI je visoko intenzivan format za upravljanje prinosom

U avgustu će, ranije od uobičajenih rokova za zemlju, biti završen razvoj kasnih prolećnih useva. Početkom avgusta, kod useva suncokreta u južnoj Bugarskoj, primećuje se tehnička zrelost (Plovdiv, Haskovo, Sliven, Jambol), a krajem prve i početkom druge dekade - takođe i u zasadima u velikom delu ratarskih regiona. Raniji hibridi kukuruza gajeni u uslovima navodnjavanja ući će u voštano i punu zrelost tokom prve dekade. Srednje kasni hibridi će završiti svoj razvoj u trećoj dekadi avgusta.

Zbog nepovoljnih agrometeoroloških uslova u prvoj polovini leta, sa produženom sušom i izuzetno visokim temperaturama, očekuju se niski prinosi kukuruza i suncokreta.

Trajno visoke temperature u julu, koje će se nastaviti i u avgustu, ozbiljno ugrožavaju žetvu prolećnih useva.

Jedini oplemenjivački centar za suncokret u zemlji je Poljoprivredni institut Dobrudža, gde su oplemenjivački naponi usmereni na stvaranje novih sorti suncokreta otpornih na volovod, plamenjaču i sušu. Jedan od novih hibrida Instituta – “Dara”, pogodan za gajenje primenom “Express” tehnologije i otporan na plamenjaču do rase 731 i na volovod do rase G, pokazuje veoma dobre rezultate u uslovima suše i visokih temperatura.

U avgustu se predviđaju maksimalne temperature u opsegu od 35–40°C. Ove vrednosti će imati negativan uticaj na cvetanje i oplodnju kod povrtarskih kultura iz kasne proizvodnje (krastavci, boranija, tikvice).

Meteorološki uslovi tokom meseca će ograničiti razvoj gljivičnih oboljenja, sa izuzetkom pepelnice na povrtarskim kulturama, vočkama i vinovoj lozi. Očekuje se povećanje populacija grinja. U vinogradima je neophodno pratiti gustinu gusenica treće generacije grozdane savijače. Tamo gde je potrebno, tretmane zaštite bilja u avgustu treba sprovoditi tokom hladnijih sati dana (na temperaturama ispod 25°C), koristeći proizvode sa odgovarajućim pre-harvest intervalom, u skladu sa periodom zrenja useva.

Izvor: NIMH

