

У септембру се не очекују падавине од пољопривредног значаја, а услови ће омогућити формирање додатног приноса од касних повртарских усева.

Автор(и): Растителна заштита  
Дата: 03.09.2025 Брой: 9/2025



U septembru će agrometeorološke uslove određivati temperature iznad klimatskih normi i padavine oko i ispod mesečne norme.

Nakon produbljene suše, padavine krajem avgusta bile su lokalnog karaktera i samo su na pojedinim mestima u centralnim i istočnim regionima navlažile

gornji sloj zemljišta. U većini ratarskih regiona, produktivna vlaga je odsutna u slojevima zemljišta od 50 i 100 cm.

Tokom prve i druge dekade septembra, ne predviđaju se padavine od agronomskog značaja, te će na mnogim mestima u ratarskim regionima suvo i zbijeno zemljište otežavati izvođenje duboke oranja i predsetvene obrade površina predviđenih za setvu uljane repice. Velika je verovatnoća ozbiljnih zakašnjenja u setvi ove uljarice, koja zahteva preciznu agrotehniku.

Agrotehnički rok za setvu uljane repice je od kraja avgusta do kraja druge dekade septembra.



U septembru će predviđeni toplotni uslovi iznad normale ubrzati završne faze razvoja kasnih ratarskih useva koji su prebrodili nepovoljne efekte produžene letnje suše. Početkom meseca, srednje-kasni hibridi kukuruza gajeni u uslovima navodnjavanja biće u fazi voštane i potpune zrelosti, dok će kasni hibridi biti u prelazu iz mlečne u voštanu zrelost.

U većini dana meseca, predviđeno relativno sušno i toplo vreme za kraj leta i početak jeseni obezbediće pogodne uslove za berbu grožđa. Kao rezultat

letnjih temperatura iznad normale, kasne sorte vinskog grožđa dostići će tehnološku zrelost ranije od uobičajenih rokova.

Meteorološki uslovi u septembru ograničiće razvoj gljivičnih oboljenja, sa izuzetkom pepelnice. Za povrtarske kulture iz kasne proizvodnje na otvorenom polju, ne treba potcenjivati tretmane zaštite bilja protiv grinja, kupusnog moljca i pamučnog sovica, koji prouzrokuju štetu i pogoršavaju kvalitet povrtarskog prinosa.

Tokom meseca, štetna aktivnost velikog dela štetočina na voćnim kulturama se završava. Krajem septembra, preporučljivo je pregledati zasad krušaka na prisustvo pupoljkaša kruške. Suzbijanje ove štetočine je efikasno samo protiv odraslih jedinki na početku jeseni. Kada gustina štetočine pređe ekonomski prag štetnosti (3 bube po stabilu), neophodno je izvršiti tretman.

Kao rezultat letnjih temperatura iznad normale, deo ranih jesenjih sorti voćaka koji nisu bili pogođeni prolećnim mrazevima dostići će zrelost za berbu (jabuke: Golden Parmena, Jonathan, Red Delicious, Golden Delicious, Canadian Reinette, itd.).

U septembru se ne predviđaju kritične minimalne temperature, a uslovi će omogućiti formiranje dodatne proizvodnje od kasnih povrtarskih kultura osetljivih na mraz.