

Decembar – neuobičajeno visoke temperature i lokalizovane padavine

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.12.2025 Брой: 12/2025



Toplo vreme za ovo doba godine tokom većeg dela novembra i prisustvo veoma dobrih rezervi vlage u zemljištu stvorili su uslove za napredak u razvoju kasno posejanih, nakon agrotehničkih rokova, jesenjih useva.

Početak decembra, prognozirane temperature iznad normale produžiće vegetacione procese ozimih žitarica u poljoprivrednim regionima zemlje.

Široko rasprostranjene padavine početkom perioda povećaće nivo jesenjih rezervi vlage u sloju zemljišta od 100 cm. Zbog padavina iznad normale u oktobru i novembru, rezerve vlage u zemljištu u sloju od jednog metra za ozime žitarice u većini poljoprivrednih regiona dostigle su nivoe do 90% PK (poljskog kapaciteta).

Krajem desetodnevnog perioda, agrometeorološki uslovi će i dalje biti određeni visokim temperaturama za ovo doba godine. U istočnim regionima, prognozirane su maksimalne vrednosti preko 14-15°C, sa verovatnoćom da izazovu nepoželjno, prevremeno bubrenje pupoljaka kod nekih ranocvetnih voćnih vrsta, što bi dovelo do smanjenja njihove otpornosti na mraz.

Pogodni uslovi za završetak jesenjih prskanja voćnih stabala radi zaštite od prezimljujućih patogena i štetočina biće stvoreni tokom druge polovine prvog desetodnevnog perioda meseca.

Pad temperatura, slabljenje i prestanak vegetacije za pšenicu i ječam očekuju se krajem prvog desetodnevnog perioda decembra.

Tokom drugog i početka trećeg desetodnevnog perioda, prognozirane prosečne dnevne temperature će prelaziti klimatske norme, ali će ostati u granicama koje će održavati ozime žitarice u mirovanju.

Početkom zime, kod pšenice će preovladavati faza trećeg lista. Mali deo useva u nekim istočnim i krajnje južnim regionima zemlje, koji su posejani na vreme – u oktobru, biće u fazi bokorenja, pogodnoj za prezimljavanje. Kasno posejane ozime žitarice, tokom druge polovine novembra, ući će u zimu nerazvijene, u početnoj fazi formiranja listova (1-2 lista). Razlog značajnih razlika u fenološkom stanju useva je odložena setva zbog nepovoljnih uslova početkom jeseni – nakon suše i naknadnih padavina iznad normale u oktobru.

Pred kraj decembra očekuje se porast temperatura, ali će njihove prosečne dnevne vrednosti ostati ispod biološkog minimuma potrebnog za nastavak vegetacionih procesa kod jesenjih useva.

Tokom meseca, prognozirane minimalne temperature, do minus 10°C, u uslovima bez snežnog pokrivača, ako potraju duži period, biće kritične za useve u početnoj fazi formiranja listova.

Očekivane padavine u decembru, blizu mesečne norme, povećaće rezerve vlage u sloju zemljišta od 100 cm do nivoa bliskih PK (poljskom kapacitetu).