

У фебруару, агрометеоролошки услови ће варирати од зимских до пролећних

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.02.2026 Брой: 2/2026



Nakon blage sezonske vremenske situacije krajem januara i početkom februara, agrometeorološki uslovi će ponovo dobiti zimski karakter.

Očekivano hlađenje će obnoviti stanje mirovanja kod jesenje setih useva u južnim i istočnim regionima i usporiti preuranjeno bubrenje pupoljaka kod nekih ranocvetnih koštičavih vrsta voćaka.

Očekivane snežne padavine će formirati snežni pokrivač, koji će pružiti zaštitu kasno posejanim ozimim žitaricama od predviđenih niskih minimalnih temperatura – do minus 11-12°C. Ove vrednosti, u odsustvu

snežnog pokrivača i pri dužem trajanju, su kritične za deo prezimljavajućih useva u fazi 1-2 lista (Poljoprivredna stanica Nikolaevo).

Tokom druge polovine prvog i tokom celog drugog dekada, agrometeorološke prilike će biti određene temperaturama oko i iznad klimatskih normi. U većini ratarskih regiona, osim u područjima južne Bugarske i duž crnomorske obale, predviđene prosečne dnevne temperature neće preći biološki minimum neophodan za nastavak vegetativnih procesa kod ozimih žitarica.

Tokom trećeg dekada februara, predviđen je značajan porast temperature, i u istočnim i južnim regionima će se stvoriti uslovi za odloženu vegetaciju kod jesenje setih useva. Do kraja meseca, faza trećeg lista će dominirati kod pšenice. Deo useva u Podunavskoj ravnici, u krajnje istočnim i jugozapadnim regionima (Novachene, Silistra, D. Chiflik, Karnobat, Sandanski) prezimljava u fazi busanja.

Očekuje se da će temperature iznad normale tokom trećeg dekada izazvati preuranjeni razvoj i kod nekih ranocvetnih koštičavih vrsta voćaka (badem, kajsija, breskva) u južnim regionima zemlje.

U februaru, očekivane padavine iznad normale će povećati rezerve vlage u zemljištu u sloju od dva metra. Rezerve vlage u jednometarskom sloju zemljišta krajem januara u većini ratarskih regiona, osim u područjima istočne Bugarske (Razgrad, Ts. Brod, D. Chiflik, Sliven, Chirpan), dostigle su nivo do poljske vodozasićenosti.

U februaru će se stvoriti pogodniji uslovi za izvođenje rezidbe u vinogradima i voćnjacima tokom druge polovine meseca, a za prihranjivanje jesenje setih useva azotnim mineralnim đubrivima i za izvođenje predsetvene obrade zemljišta na površinama namenjenim setvi ranih prolećnih useva (grašak, grahorica, ovas, jarni ječam) – tokom trećeg dekada.

Rokovi za zabranu đubriva koja sadrže azot

Ne zaboravite periode u kojima je primena đubriva koja sadrže azot zabranjena za ratarske i trajne useve, voćnjake, livade i trajne pašnjake u skladu sa Zakonom o vodama 2 "Zaštita voda od zagađivanja nitratima iz poljoprivrednih izvora". Ovaj zahtev je posebno važan za korisnike mera "Agroekologija i klima" i "Organska poljoprivreda", kao i za sve poljoprivrednike čije se zemljište nalazi u okviru zona osetljivih na nitratre. Oni su dužni da poštuju Nitratnu direktivu i pravila dobre poljoprivredne prakse.

Prema zahtevima, postoje određeni periodi u kojima je rasipanje đubriva koja sadrže azot zabranjeno:

- Za južnu Bugarsku, to je period od 1. novembra do 20. februara i obuhvata okruge: Blagoevgrad, Burgas, Kardzhali, Pazardzhik, Plovdiv, Sliven, Smolyan, Stara Zagora, Haskovo, Yambol, grad Sofija, Sofijska oblast, Pernik i Kyustendil;
- Za severnu Bugarsku, period je od 1. novembra do 25. februara i uključuje okruge: Varna, Vratsa, Veliko Tarnovo, Vidin, Gabrovo, Dobrich, Lovech, Montana, Pleven, Razgrad, Ruse, Silistra, Targovishte i Shumen;
- Od 1. novembra do 5. februara nije dozvoljeno đubrenje jednogodišnjih useva posejanih u jesen;
- Od 1. novembra do 25. februara – na slobodnim površinama pripremljenim za setvu i sadnju useva;
- Prilikom podizanja novih voćnjaka, đubriva koja sadrže azot se ne primenjuju od 15. novembra do 25. februara.

Godišnja norma za đubriva koja sadrže azot, uključujući organska i mineralna (neorganska), iznosi do 17 kilograma aktivne supstance po dekaru. Poljoprivrednici su dužni da vode evidenciju o đubrenju, u koju se upisuje doza đubrenja, naziv, vrsta i količina primenjenog đubriva, kao i rezultati prethodnih analiza zemljišta i preporuke stručnjaka za ishranu biljaka.