

Početkom marta, visok sadržaj vlage u gornjim slojevima zemljišta će otežati setvu ranih prolećnih useva.

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 02.03.2026 Брой: 3/2026



Tokom prve dekade marta, agrometeorološki uslovi će biti određeni iznadprosečnim temperaturama. Predviđeno toplo vreme na početku meseca, sa maksimalnim vrednostima iznad 15-16°C, aktiviraće vegetativne procese u jesenjim usevima i voćnim kulturama u ratarskim regionima zemlje. U ovom periodu, treći list će prevladavati u usevima pšenice u severozapadnim regionima, dok će u istočnim i južnim regionima dominirati faza busanja.

U voćnim kulturama, bez opasnosti od kritičnih minimalnih temperatura, javiće se faze bubrenja i pucanja pupoljaka kod ranocvetajućih koštičavih vrsta u južnim regionima.

Tokom perioda ne očekuju se značajne padavine. Zbog iznadprosečnih padavina u februaru, rezerve vlage u zemljištu u sloju od 100cm u većini ratarskih regiona dostigle su nivo do poljskog vodnog kapaciteta. U delovima južnih regiona, gde su padavine premašile mesečne norme dva do tri puta (Sliven -111l/m², Stara Zagora - 130l/m², Haskovo - 155l/m², Kardžali - 150l/m², Elhovo - 121l/m², Čirpan - 118l/m²), ozimi žitari usevi su previše vlažni.



I u narednom periodu, visok sadržaj vlage u gornjim slojevima zemljišta na mnogim mestima u južnoj Bugarskoj otežaće prihranu jesenjih useva azotnim mineralnim đubrivima i izvođenje predsetvene obrade zemljišta na površinama namenjenim za setvu ranih prolećnih useva (grahorica, grašak, jarni ječam).

Nakon očekivanog kratkog zahlađenja na kraju prve dekade, za većinu dana druge, prognoziraju se prosečne dnevne temperature iznad biološkog minimuma neophodnog za vegetaciju ozimih žitarah useva.



Tokom treće dekade marta, razvoj poljoprivrednih useva će se odvijati pod temperaturama bliskim klimatskim normama. Do kraja meseca, faza busanja će prevladavati kod pšenice. Kod ozimih žitarih useva posejanih u agrotehničkom roku, primećen je porast koeficijenta busanja.

Tokom marta, u voćnim kulturama javiće se sledeće faze: bubrenje, pucanje voćnih pupoljaka, formiranje cvetnih pupoljaka i cvetanje kod ranocvetajućih koštičavih vrsta (badem, kajsija, breskva, trešnja). Predviđene minimalne temperature tokom meseca, do minus 7°C, biće kritične za voćke koje su ušle u faze formiranja cvetnih pupoljaka i cvetanja.

Očekivane padavine u martu, bliske mesečnim normama, održaće dobre rezerve vlage u zemljištu za ozime žitare useve. Zbog iznadprosečnih padavina u februaru (Šumen -103 l/m², Razgrad -104 l/m², Ruse - 103 l/m², Silistra - 100 l/m², Dobrič - 98 l/m², Haskovo - 155 l/m², Kardžali - 151 l/m², Sliven -111 l/m², Stara Zagora - 130 l/m², Elhovo - 123 l/m², Čirpan - 119 l/m²), rezerve vlage u sloju zemljišta od 100cm za jesenje useve dostigle su nivo blizak poljskom vodnom kapacitetu.

Sredinom marta, počinje agrotehnički rok (15-20.03) za setvu suncokreta u južnoj Bugarskoj, a sredinom treće dekade (25.03–5.04) – u Podunavskoj ravni.