

# 'Крајем маја и почетком јуна – нестабилно време са високим ризиком од града и условима за развој болести код пољопривредних култура'

*Автор(и):* Растителна заштита  
*Дата:* 02.06.2026 *Број:* 6/2026



Tokom predstojećeg sedmodnevnog perioda (29. maj – 4. jun 2026. godine), agrometeorološki uslovi biće određeni nestabilnim vremenom. Razvoj poljoprivrednih kultura odvijaće se na temperaturama bliskim klimatskoj normi i uz optimalne rezerve vlage u zemljištu, kao rezultat značajnih padavina u maju, koje su premašile mesečnu normu u većini ratarskih regiona.

Tokom ovog perioda, ozime žitarice će prolaziti kroz fazu nalivanja zrna i mlečne zrelosti, prvenstveno u istočnim i južnim regionima – Sandanski, Targovište, Silistra, Provadija i Karnobat.



*Žitne stenice (Eurygaster integriceps Put.) oštećuju stabljike žitarica i zrno, što rezultira smanjenom količinom i lošijim kvalitetom. Oštećena zrna sadrže manju količinu glutena, a dobijeno brašno ima loša svojstva za pečenje, što dovodi do gustog hleba. <https://www.plant-protection.com/bg/article/2277?lang=bg>*

Krajem maja i početkom juna, štetu na pšenici nanose larve žitne stenice, što zahteva pregled useva. Ako gustina štetočine premaši ekonomski prag (2 larve/m<sup>2</sup>), tretman treba sprovesti prvom prilikom.

---

### **VIXERAN: Prirodna snaga i održiv prinos kukuruza**

---

Tokom perioda, kod kukuruza i suncokreta odvijaće se formiranje listova. Kod useva suncokreta posejanih u agrotehničkom roku u najjužnijim regionima, takođe će se primetiti početak faze formiranja cvasti.



*Pepelnica Oidium tuckeri. Visoka vlažnost vazduha i uporno zagrevanje vremena tokom meseca predstavljaju preduslove za razvoj bolesti. <https://www.plant-protection.com/article/1802?lang=bg>*

Kod vinove loze doći će do cvetanja grozdova – kritična faza za infekciju pepelnicom.



*Simptomi fuzariozne paleži klasa pšenice. <https://www.plant-protection.com/article/1780?lang=bg>*

Česte padavine tokom perioda stvoriće uslove za razvoj bolesti: fuzariozna palež klasa pšenice, kasna smeđa trulež na plodovima višnje koje sazrevaju i siva trulež na jagodama. Postoji visok rizik od grada i poleganja useva pšenice.