Током друге половине новембра, агрометеоролошки услови ће омогућити завршетак јесење сетве, садњу воћњака и спровођење фитосанитарних активности у воћњацима.

Растителна Защита

Датум 13.12.2026 | **Број** 12/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Језик** SR
www.plant-protection.com/article/2491?lang=sr



Већину дана током прве половине новембра агрометеоролошки услови биће одређени нестабилним и сезонски хладним временом. Током овог периода прогнозиraju се падавине изнад нормале, које ће у многим деловима земље одложити сетву пшенице и јечма. Суша на почетку јесени ометала је спровођење предсетвене обраде земљишта на површинама и из тог разлога су у великом делу пољопривредних региона пропуштени агротехнички рокови у октобру за сетву озимих житарица.

До средине новембра развој посејаних озимих култура одвијаће се успореним темпом. На високим пољима, где почетком месеца нису искључене падавине, укључујући и сneg, прогнозиране вредности просечних дневних температура биће близу биолошког минимума потребног за вегетацију озимих житарица.

Очекиване падавине на почетку и на крају периода (13 - 19.11.2026) одржаваће висок садржај влаге у површинским слојевима земљишта, што ће додатно одложити сезонске агротехничке мере, од којих је најважнија завршетак сетве пшенице. Падавине током прве декаде новембра премашиле су 60-70 l/m² у многим деловима земље и наглo су повећале резерве влаге и у дубљим слојевима земљишта. У делу Панонске низије, у источним и јужним регионима (агрометеоролошке станице: Новачене, Николајево, Силистра, Долни Чиflик, Пловдив, Хасково, Јамбол, Карнобат), резерве влаге у земљишту у слоју од 50 и 100 cm достигле су нивое изнад 80% ПК (пољског капацитета).

Повећање температура и позитивна промена агрометеоролошких услова очекују се током друге половине новембра. Током овог периода вегетациони процеси у озимим културама одвијаће се на темпера-

turama bliskim klimatskim normama i uz dobre rezerve vlage u zemljištu. Krajem novembra, kod pšenice i ječma, u zavisnosti od datuma setve, biće zabeležene različite faze. Faza nicanja i početnog formiranja listova javiće se kod kasno posejanih novembarskih kultura.



Kod ozimih žitarica posejanih u oktobru preovlađivaće faza trećeg lista (Bazovets, Silistra, Provadija, Karnobat). Tokom meseca ne prognoziraju se kritične minimalne temperature za poljoprivredne kulture.



Tokom druge polovine novembra ne očekuju se značajne padavine i uslovi će omogućiti završetak jesenje setve, sadnju voćaka i sprovođenje fitosanitarnih mera u voćnjacima.



Tokom meseca mora se nastaviti praćenje ozimih kultura na prisustvo štetočina. Krajem oktobra utvrđena je povećana populacija poljske voluharice i u novembru, ukoliko populacija štetočine pređe ekonomski prag (preko 2 aktivne kolonije po dekari), potrebno je izvršiti tretiranje površina odobrenim rodenticidima.