

Током прве половине маја, биће повољни услови за развој инфективног позадинског тла бројних гљивичних болести у пољопривредним усевама.

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 03.05.2017 Брой: 5/2017



Česte, lokalno intenzivne padavine početkom maja biće preduslov za povećanje pritiska infekcije od strane brojnih gljivičnih oboljenja: fuzarioze i rđe (žute, braon) kod pšenice i ječma; plamenjače kod povrtarskih kultura; krastavosti i rupičavosti lišća kod voćaka; plamenjače i pepelnice kod vinove loze.

Tokom prve dekade maja, agrometeorološki uslovi će biti određeni nestabilnim vremenom sa čestim pljuskovima, što će u mnogim delovima zemlje ometati sprovođenje sezonskih agrotehničkih aktivnosti – završetak setve kukuruza, predsetvena obrada zemljišta i setva kasnih termofilnih jarih useva – pasulja, pamuka, kikirikija, lubenica, dinji, itd.

Tokom ovog perioda, razvoj jesenje setih useva i posejanih jarih kultura odvijaće se pri prosečnim dnevnim temperaturama bliskim klimatskim normama i uz prisustvo dobrih rezervi vlage u zemljištu u sloju od 50 cm, iznad 85% poljskog vodnog kapaciteta (PVK). Tokom dekade, kod pšenice i ječma u poljskim regionima zemlje, u masovnom obimu će se uočiti faza klasanja, a na pojedinim mestima u južnoj Bugarskoj – početak cvetanja.

Krajem prve i početkom druge dekade, predviđa se porast temperatura i ubrzanje vegetacije kod poljoprivrednih kultura. Do sredine maja, kod ozimih žitatica će se odvijati cvetanje i oplodnja, a kod kukuruza i suncokreta – formiranje lišća. Kod ranih jarih useva (grahorica, grašak) uočiće se formiranje pupoljaka i cvetanje.

Kod voćnih kultura koje nisu bile pogođene aprilskim mrazovima, odvijaće se formiranje i uvećanje zametaka ploda. Kod vinove loze, uočiće se pojava cvatnje.

Česte, lokalno intenzivne padavine početkom maja biće preduslov za povećanje pritiska infekcije od strane brojnih gljivičnih oboljenja: fuzarioze i rđe (žute, braon) kod pšenice i ječma; plamenjače kod povrtarskih kultura; krastavosti i rupičavosti lišća kod voćaka; plamenjače i pepelnice kod vinove loze. Pogodniji uslovi za sprovođenje tretmana zaštite biljaka javiće se krajem prve i u prvoj polovini druge dekade.

Do sredine maja, ne predviđaju se kritične minimalne temperature za poljoprivredne kulture. Tokom prve dekade, očekuje se povećana verovatnoća pojave grada. U slučaju oštećenja od grada, preporučljivo je da se pogođeni usevi tretiraju pri prvoj mogućnosti fungicidima na bazi bakra radi bržeg zarastanja rana i smanjenja rizika od sekundarnih infekcija.

Izvor: NIMH-BAS