

Мере заштите биља у јуну за винограде

Автор(и): гл.експерт Татјана Величкова, Дирекција "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 13.06.2017 Број: 6/2017



U ovom periodu, vinova loza je od fenofaze "puna cvetnost" do fenofaze "zrno graška" - "zatvaranje grozda".

Glavni štetočine za period

Plamenjača vinove loze *Plasmopara viticola*

Pepelnica *Oidium tuckeri*

Siva trulež *Botrytis cinerea*

Grozdana savijač *Lobesia botrana*

Vinova štitasta vaš *Pulvinaria vitis*

Žuti vinov grinja *Schizotetranychus viticola*

Siva trulež

U fenofazi "puna cvetnost", na cvetovima i cvetnim stapkicama formiraju se braon pege, koje su prekrivene sporulacijom patogena. Ovi simptomi su poznati kao rana siva trulež.

Strategija suzbijanja: U kišnom i toplom vremenu, neposredno posle cvetanja, pri pojavi prvih zrna i pri zatvaranju grozda, vrši se tretiranje jednim od registrovanih sredstava za zaštitu bilja.

Ovlašćena sredstva za zaštitu bilja: arvak 50 WG - 100-150 g/ha; geox WG - 100 g/ha; driza WG - 100-150 g/ha; cabrio top – 0.2%; cantus - 100 g/ha; mevalon - 160-400 ml/ha; proletus 50 WG - 120 g/ha; rebut WG - 100-150 g/ha; sabueso - 100-150 g/ha; synpro - 150 ml/ha; switch 62.5 WG - 0.08%; thiram 80 WG – 0.4%; top plus 70 WP – 0.1%; topsin M 70 WDG – 0.1%; folder 80 WG - 150 g/ha; follow 80 WG / friller 80 WG / flowet 80 WG - 187.5 g/ha; folpan 80 WDG - 0.1 % + ardent 50 SC - 0.015 %; shavit F 72 WDG – 0.2%.

Grozdana savijač

U junu leti leptir druge generacije štetočine. On polaže jaja na zrna veličine graška (prva zrna). Larve oštećuju prva zrna glodanjem i izjedanjem unutrašnjosti zrna zajedno sa semenkama. Oštećena zrna su slabo povezana svilastim nitima. Jedna larva ošteti od 7 do 24 zrna.

Strategija suzbijanja: Tretmane treba sprovesti pri **ETL**: za stonih sorti 6-7 larvi na 100 prvih zrna, a za vinarske sorte 11-12 larvi na 100 prvih zrna.

Ovlašćena sredstva za zaštitu bilja: aficar 100 EC – 40 ml/ha; dascor 440 - 50 ml/ha; decis 100 EC - 12.5-17.5 ml/ha; dipel 2 X - 0.1 %; dukat 25 EC - 70 ml/ha; efcimetrin 10 EC / cyper 10 - 40 ml/ha; karate zeon 5 CS – 0.02%; coragen 20 SC - 18 ml/ha; luzindo 40 WG - 0.025 kg/ha; mageos - 10 g/ha; maltoato - 40-60 ml/ha; nexcid 015 CS - 0.03 %; nurelle D / chlorsirin 550 EC / samba - 60 ml/ha; runner 240 SC - 0.04 %; rapax - 75-100 ml/ha; reldan 40 EC - 0.12 %; sineis 480 SC - 4-18 ml/ha; sumi alpha 5 EC / sumicidin 5 EC - 0.025 %; forey 48 B - 0.15 %; fury 10 EC - 0.0125 %; ciklon 10 EC - 40 ml/ha; cyperfor 100 EC - 40 ml/ha; citrin max /

cyperkyl 500 EC / cypert 500 EC / poli 500 EC - 6 ml/ha; sherpa 100 EW / aficar 100 / cyperfor 100 EW / ciklon 100 EW - 25 ml/ha; sherpa 100 EC - 40 ml/ha.