

Време за жетву

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 03.07.2017 Брой: 7/2017



Nakon junskih toplotnih talasa, tokom prve dekade jula očekuje se normalizacija termičkih uslova. Predviđene padavine na početku meseca poboljšaće uslove za vegetaciju jarih useva, od kojih će veliki deo ući u reproduktivne faze svog razvoja. Tokom meseca, predviđene izuzetno visoke maksimalne temperature, u opsegu od 38-42°C, u kombinaciji sa niskom vlažnošću vazduha, imaće negativan uticaj na cvetanje i oplodnju kod suncokreta, kukuruza i povrtarskih kultura (paradajz, krastavci, paprike, tikvice).

U julu će se razvoj poljoprivrednih useva odvijati na temperaturama oko i iznad klimatskih normi, a na mnogim mestima u nizijskim predelima – u uslovima deficita vlage u zemljištu. **Predviđeno sušno vreme tokom većeg dela meseca zahtevaće primenu odgovarajućeg režima navodnjavanja jarih useva, sa povećanim**

normama zalivanja u severozapadnim i južnim regionima zemlje, gde su rezerve vlage u zemljištu u sloju od 50 cm na početku leta oskudne - ispod 50-55% poljskog vodnog kapaciteta (PVK).

Nakon junskih toplotnih talasa, tokom prve dekade jula očekuje se normalizacija termičkih uslova. Predviđene padavine na početku meseca poboljšaće uslove za vegetaciju jarih useva, od kojih će veliki deo ući u reproduktivne faze svog razvoja.

Tokom prve i druge dekade, kod kukuruza će se javiti sledeće faze: metličanje, cvetanje metlice i svilanje. Tokom treće dekade, neki od ranih hibrida kukuruza u poljskim uslovima ući će u fazu mlečne zrelosti.

U julu će suncokret proći kroz cvetanje, oplodnju i nalivanje zrna. Krajem meseca, u pojedinim usevima u Podunavlju i krajnjim istočnim i južnim regionima, uočiće se početak faze sazrevanja. Tokom treće dekade, poljski pasulj u nizijskim predelima završiće svoj razvoj.

Tokom meseca, predviđene izuzetno visoke maksimalne temperature, u opsegu od 38-42°C, u kombinaciji sa niskom vlažnošću vazduha, imaće negativan uticaj na cvetanje i oplodnju kod suncokreta, kukuruza i povrtarskih kultura (paradajz, krastavci, paprike, tikvice).

Agrometeorološki uslovi u julu ograničiće razvoj brojnih gljivičnih oboljenja kod poljoprivrednih useva, sa izuzetkom pepelnice. Suvo i toplo vreme biće preduslov za povećanje populacije određenih štetočina - grinja. U voćarskim kulturama, ne treba potcenjivati štetnu aktivnost druge generacije voćnih moljaca. Tokom meseca, tretmane zaštite bilja treba sprovoditi u hladnijem delu dana. Za jul je predviđena povećana verovatnoća pojave grada. U slučaju oštećenja od grada, preporučljivo je da se oštećene voćne i povrtarske kulture što pre tretiraju odgovarajućim fungicidima na bazi bakra.

Povoljniji uslovi za obavljanje najvažnije sezonske aktivnosti – žetve pšenice – nastupiće sredinom prve, u prvoj polovini druge, i tokom većeg dela treće dekade. Očekuje se dobar prinos zrna.

Izvor: RHMZ-SANU