

Заштита винограда у јулу

Автор(и): гл.експерт Татјана Величкова, Дирекција "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 06.07.2017 Брой: 7/2017



U ovom periodu, vinova loza se nalazi u fenološkoj fazi od "završetka cvetanja" do "početka zrenja bobica" kod ranih sorti.

Glavni štetočine za ovaj period

Plamenjača vinove loze *Plasmopara viticola*

Pepelnica *Oidium tuckeri*

Siva trulež *Botrytis cinerea*

Bakterioza vinove loze (bakterijski rak) *Agrobacterium vitis*

Grozдова savijača *Lobesia botrana*

Vinova lozina savijača *Theresimima ampellophaga*

Vinova štitasta vaš *Pulvinaria vitis*

Vinova žuta grinja *Schizotetranychus viticola*

Bakterioza vinove loze (bakterijski rak)

Kod zaraženih biljaka na odrvenelim delovima, blizu površine zemlje ili neposredno ispod nje, uočavaju se izrasline (tumori). Obolele biljke pokazuju usporen rast, hlorotične listove i lako se smrzavaju tokom hladne zime.

Strategija suzbijanja:

U julu mesecu, loze koje pokazuju simptome bolesti moraju se obeležiti.

Vinova štitasta vaš

Izleganje larvi se nastavlja tokom prve polovine jula. One nanose štetu sisanjem biljnih sokova sa listova, izdanaka i grozdova. Presvlače se jednom, hrane se određeno vreme, zatim napuštaju mesta ishrane i odlaze na mesta prezimljavanja. Kao rezultat oštećenja, vinova loza slabi.

Strategija suzbijanja:

Hemijsko suzbijanje se sprovodi protiv mladih larvi.

Ovlašćeni proizvod za zaštitu bilja:

movento 100 sc - 0,075-0,095%;

