

# Недељни агрометеоролошки прогност за крај јула и почетак августа

Автор(и): Растителна заштита  
Дата: 29.07.2017 Брой: 7/2017



*Krajem jula i tokom prvih dana avgusta, razvoj poljoprivrednih useva će se odvijati na temperaturama bliskim klimatskim normama, a u mnogim delovima zemlje – uz poboljšane rezerve vlage u zemljištu.*

Nakon oluja, tuče i bujičnih kiša (Ruse - 45 l/m<sup>2</sup>, Silistra - 43 l/m<sup>2</sup> i Šumen - 33 l/m<sup>2</sup>) koje su pale tokom poslednjih dana proteklog perioda, u narednom periodu se očekuje stabilizacija vremena i promena agrometeoroloških uslova. Tuča koja je pala na mnogim mestima u Severnoj Bugarskoj (Vraca, Poljski Trambeš, Trojan, Ruse, Carev Brod) ponovo nije poštedela poljoprivredne useve. Pčinjena je šteta delu nepožnjevenih useva pšenice (leglo useva, osipanje klasa), kao i jari usevima, povrtarskim kulturama i voćnim drveću.

Na početku narednog perioda, pri prvoj prilici, povrtarske kulture, voćke i vinova loza pogođene tučom poželjno je tretirati fungicidima na bazi bakra kako bi se ubrzalo zarastanje rana i smanjile sekundarne infekcije patogenima (siva trulež na vinovoj lozi, kasna smeđa trulež na plodovima voćaka, plamenjača krompira i alternarioza na paradajzu).

Krajem jula i tokom prvih dana avgusta, razvoj poljoprivrednih useva će se odvijati na temperaturama bliskim klimatskim normama, a u mnogim delovima zemlje – uz poboljšane rezerve vlage u zemljištu. Tokom perioda, kod ranijih hibrida kukuruza, primećuje se faza mlečne zrelosti i prelaz iz mlečne u voštanu zrelost u usevima na pojedinim mestima u Podunavskoj ravnici i u južnim regionima zemlje. Kod suncokreta, odviјаće se punjenje zrna. Početkom avgusta, deo useva u Južnoj Bugarskoj će ući u početak faze zrenja.

Tokom perioda, povećani sadržaj vlage u gornjim slojevima zemljišta će na pojedinim mestima usporiti završetak žetve pšenice.

*Izvor: NIMH-BAN*