

Mayıs ayının ilk yarısındaki nemli hava, fungal patojenlerin gelişimi için bir ön koşuldur.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.05.2019 Брой: 5/2019



Yağışlı hava, önlenmesi sistemik fungusitlerin uygulanmasını gerektiren fungal patojenlerin ortaya çıkması ve gelişmesi için koşullar yaratacaktır.

3-9 Mayıs döneminde, dinamik ve değişken tarımsal meteorolojik koşullar öngörülmektedir. Sinoptik tahmine göre, tarım ürünlerindeki vejetasyon süreçleri, iklim normlarının altındaki ortalama sıcaklıklar ve sık yağışlarla ilerleyecektir.

Dönemin ilk yarısında, ülkenin ova kesimlerindeki birçok yerde yoğun olmak üzere yağış beklenmekte olup, bu durum atlatılan erken ilkbahar kuraklığı sonrası iyileşen toprak nem rezervlerini koruyacaktır. Beklenen rüzgarlı

hava, kışlık tahıl ürünleri, kanola ve kalıcı meyve plantasyonlarındaki bitki koruma faaliyetlerini yürütme olanaklarını ek olarak kısıtlayacaktır.

Dönem boyunca, buğday sapa kalkma, sapa kalkmadan başaklanmaya geçiş ve başaklanma aşamalarında olacaktır. Kanolada çiçeklenme, bakla oluşumu ve büyümesi gözlemlenecektir. Ekilen ilkbahar ürünlerinde ise yaprak oluşumu gerçekleşecektir.

Yağışlı hava, önlenmesi sistemik fungusitlerin uygulanmasını gerektiren fungal patojenlerin ortaya çıkması ve gelişmesi için koşullar yaratacaktır.

Dönem sonunda, tarımsal meteorolojik koşullarda bir iyileşme (sıcaklıklarda başlangıç artışı, rüzgarın zayıflaması, yağış olasılığının düşük olması) ve tarımsal teknik faaliyetleri yürütmek için daha elverişli fırsatların oluşması öngörülmektedir.

Kaynak: NIMH