

Mayıs Ayında Çilek ve Ahududu Hastalıkları ve Zararlıları

Автор(и): проф. д.с.н Иванка Лечева; проф. Мария Боровинова

Дата: 24.05.2019 Брой: 5/2019



Ahududu durumunda püskürtmeler, didymella, antraknoz, sürgün diplerinin kuruması/leptosphaeriosis/, gri küf, ahududu agrilus, ahududu gal sineği, ahududu gal ve ahududu böceğine karşı yönlendirilir. Hastalıklara karşı aşağıdaki fungusitlerden biri kullanılır: Dithane M45 – %0.2, Kocide 200 WG – %0.12, Funguran OH 50 WP – %0.15 ve Cuprozet Gold M – %0.15. Ahududu zararlılarının kontrolü için, yetkili bitki koruma ürünleri listesinde yer alan bir insektisit bulunmamaktadır. Tsolova, 2002'ye göre, insektisitler Bi-58 – %0.1, Karate Zeon – %0.02, Vaztak New – %0.015 ve Decis 2.5 EC – %0.04 belirtilen zararlılara karşı etkilidir. Yazar, ilk iki insektisit ilk püskürtmede, diğer ikisinin ise ikinci püskürtmede kullanılmasını önermektedir. Akarların ortaya çıkması

durumunda, %0.3–0.5 konsantrasyonda NeemAzal TS uygulanır. Bu biyoürün aynı zamanda yaprak bitleri ve yaprak pirelerini de etkiler.

Çilek plantasyonları Mayıs ayında gri küf, külleme, çilek hortumlu böceği ve çilek sap hortumlu böceğine karşı ilaçlanır. Gri küfe karşı aşağıdaki fungusitlerden biri kullanılır: Switch 62.5 WG – 100 g/da, Signum WG – 75 g/da, Synpro SC – 150 ml/da, Captan – 150 g/da, Thiram 80 WG – %0.3, Shavit F WDG – %0.2, Prolectus 50 WG – 80–120 g/da. Çileği küllemeden korumak için, onaylı fungusitlerden biriyle püskürtme yapılır: Systhane 20 EW – 30 ml/da, Systhane Ecozon EW – 55–130 ml/da, Cidely Top DC – 10 ml/da, Ortiva Top SC – 100 ml/da, Shavit F 72 WDG – %0.2, Thiovit Jet 80 WG – 500 g/da. Listelenen fungusitlerden Cidely Top DC aynı zamanda beyaz yaprak lekesine karşı da etkilidir.

Hortumlu böceklere karşı Avant 150 EC – 25 ml/da veya Calypso 480 SC – 20 ml/da kullanılır.