

Рамук коџнѝлѝ (Helicoverpa armigera L.)

Автор(и): Растителна защита
Дата: 17.09.2019 Брой: 9/2019



Рамук yeџѝл курду (**Helicoverpa armigera L.**) son yıllarda giderek artan bir zararlılık göstermektedir. 120'den fazla kùltùr ve yabani bitki türüne saldırabilme yeteneğine sahiptir. Sebze bitkilerinde biber, domates ve patlıcan meyvelerinde kurtlanmaya neden olur.

Zararlı evresi larvalardır; yaprakları, tomurcukları ve çiçekleri kemirirler ve ilerleyen bir evrede yeџѝл meyveleri etkileyerek içlerine girip içerikleriyle beslenirler. Yeџѝл kurda karşı mücadele önlemleri, ikinci ile üçüncü dönem arasındaki genç larvalara yöneltildiğinde etkilidir. Nesli kontrol altına almak için, meteorolojik koşullara ve insektisit kalıntı etkisine baęlı olarak 8-10 gün aralıklarla iki uygulama yapılması gerekmektedir.

Zararlı mücadele stratejisi

Düzenli tarla kontrolleri. Erginlerin beslendiği, yumurtaların bırakıldığı ve genç larvaların kültür bitkilerine geçmeden önce beslendiği yabancı ot örtüsünün kontrolü.

Ruhsatlı bitki koruma ürünleri

Coragen 20 SC 14–20 ml/da; Avant 150 EC 25 ml/da; Altacor 35 WG 8–12 g/da; Ampligo 150 ZC 40 ml/da; Affirm 095 SG 150 g/da; Nurelle D / Sanba / Chlorsirin 550 EC 50 ml/da, vb.

Sebze bitkilerinin organik üretiminde, domates, biber ve patlıcan için kayıtlı olan Rapax (*Bacillus thuringiensis* subsp. kurstaki, suş EG 2348) 100–200 ml/da dozunda ve Cyneis 480 SC (Spinosad) 12.5–30 ml/da dozunda kullanılabilir. Yer üstünde zarar yapan noktuid güvelerini sınırlandırma önlemleri arasında, laboratuvar koşullarında önceden kitlesel olarak üretilen ve tehdit altındaki alanlara salınan yumurta parazitoiti *Trichogramma* da yer alabilir.