

Bahçede Sonbahar Bitki Koruma Faaliyetleri

Автор(и): д-р Елена Манчева, Виола АЕ – Сливен

Дата: 26.09.2019 Брой: 9/2019



Eylül ayında yaz-sonbahar kuraklığı devam eder. Aylık ortalama yağış miktarının 25-30 l/m² olduğu doğu bölgelerde daha belirgin hissedilir. Ülkenin batı kesiminde ise 40-50 l/m²'yi geçmez.

Bazı yıllarda, aylık ortalama yağış 5 ila 10 l/m² arasına ulaşır. Ortalama günlük sıcaklık 15 ila 20 °C arasındadır ve 20 Eylül'den sonra neredeyse 2-3 °C düşer. En yüksek günlük sıcaklık 28-32 °C'ye ulaşır ve en düşük ortalama sıcaklık ise 3 ila 8 °C arasındadır.

Bu iklim koşullarında, ortam çok döl veren böcek ve akarların ortaya çıkması ve çoğalması için elverişlidir. Son nesillerini geliştirirler ve bu popülasyonların yoğunluğu, büyük ölçüde bir sonraki yıldaki zarar seviyesini

belirleyecektir. Ay boyunca, bol çiy oluşumu için koşullar oluşur; bu da elma ve armut kabuğu uyuzu, geç domateslerde mildiyö ve diğer hastalıkların enfeksiyonlarına neden olur.

Elma ve Armut

Ayın başında, elma içkurdu uçuşu (ikinci neslin sonu ve kısmen üçüncü nesil) izlenmeli ve gerektiğinde ilaçlama yapılmalıdır.

Kapsamlı bir inceleme ve geç kabuk uyuzu enfeksiyonlarının tespitinden sonra, ayrıca ürün depolama sırasında gelişen hastalıkların kontrolü için, Topsin M 70 WG - %0.1 veya Top plus 70 WP - %0.1 ile ilaçlama yapılır. Elma ve armutların iyi saklanması ve depolama sırasındaki çürüme ve bozulmaların azaltılması için, ayrıca hasat sonrası Topsin M 70 WG - %0.120 ile bir ilaçlama yapılması tavsiye edilir. İlaçlamadan sonra meyveler kurumaya bırakılır ve ardından soğuk odalara veya derin, serin mahzenlere yerleştirilir.

Bağlar

Bu dönemde, gri küf, tanelerin renklenme başlangıcından tüketime kadar asmada önemli zarara neden olur. Bu nedenle, Eylül ayındaki yağışlı ve serin havalarda, Topsin M 70 WG - %0.2 ile ilaçlama yapılır. Bu zamanda, salkım güvesinin üçüncü nesil erginleri de uçuş halindedir. Tırtıllar, olgunlaşan veya zaten olgunlaşmış üzüm tanelerine zarar verir. Zararlıların kontrolü için, fungusitli püskürtme çözeltisine kayıtlı bir piretroit eklenir.

Bir yaşındaki asma fidanları, aşı yerinin 3-5 cm üzerine kadar toprakla örtülür. Bu işlem Eylül sonunda gerçekleştirilir.

Bitki Koruma Kanunu uyarınca, çiftçiler sadece ilgili ürün ve zararlı için kullanımına izin verilen ve uygun dozda olan bitki koruma ürünlerini kullanmakla yükümlüdür.

Piyasaya sunulmasına izin verilen bitki koruma ürünleri, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı'nın web sitesinde, <http://www.babh.government.bg/> elektronik adresinde veya "Piyasaya sunulması ve kullanımına izin verilen bitki koruma ürünleri listesi" 2019'da yayınlanmıştır.

Bitki koruma ürünleri sadece yetki belgesine sahip ticari şirketlerden satın alınmalıdır!

Dikkat! Bitki koruma ürünleri ile çalışırken, iş güvenliği, arı kolonilerinin zehirlenmeye karşı korunması ve çevrenin kirlenmeye karşı korunması için tüm gereklilikler yerine getirilmelidir!