

Ekim ayı için tarımsal meteorolojik tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 11.10.2019 Брой: 10/2019



Ekim ayında tarımsal meteorolojik koşullar, iklim normalleri civarında ve üzerindeki sıcaklıklar ile aylık ortalamalara yakın yağışlar tarafından belirlenecektir.

Ekim ayının başında, maksimum değerleri 29-30°C'ye kadar çıkan normalin üzerinde tahmin edilen sıcaklıklar, geç çeşit meyve ağaçları ve üzümelerin olgunlaşmasını hızlandıracak ve geç sebze ürünlerinden ek verim oluşumu için bir ön koşul olacaktır.

İlk on günlük dönemin ikinci yarısındaki mevsim normallerinin üzerindeki sıcak havanın ardından, termal koşulların normale dönmesi bekleniyor. Eylül sonundaki yağışlar ve Ekim ayının ilk on gününde beklenen yağmurlar, sonbahar başında ekilen ürünlerin çıkışı için nem sağlayacaktır. Yaz sonunda ülkenin birçok

bölgesinde yaşanan kuraklık, sonbahar ürünleri ekimi için ayrılan alanların ekim öncesi toprak işlemlerini geciktirdi. Bu nedenle, tarla bölgelerinin büyük bir kısmında kışlık kanolanın tarımsal ekim zamanları kaçırılmıştır. Ekim ayı, kışlık tahıl ürünlerinin ekimi için optimal dönemdir. İlk on günlük dönem, Kuzey Bulgaristan'da buğday ekimi için tarımsal dönemdir, 15-25 Ekim tarihleri arasında Güney Bulgaristan'da ve ay sonunda ise Karadeniz kıyısı boyunca ekim yapılır.

İkinci ve üçüncü on günlük dönemlerin çoğu gününde, kanola ve kışlık tahıl ürünlerinin ekili durumlarının gelişimi, normale yakın termal koşullar altında orta düzeyde bir hızda ilerleyecektir. Ekim ayının ikinci yarısında tahmin edilen yağışların, 50 cm'lik toprak katmanındaki nem rezervleri düzeyini ve sonbahar ürünlerinin ilk vejetasyon aşamalarının seyri için gerekli koşulları iyileştirmesi beklenmektedir. Ay sonunda, buğdayda ekim tarihlerine bağlı olarak şu aşamalar gözlemlenecektir: çıkış, üçüncü yaprak ve kardeşlenme başlangıcı, özellikle Ekim başında ekilen tarlalarda. Kanolada ise yaprak oluşumu devam ediyor olacaktır. Ekim sonunda, Eylül ayında ekilen en erken kanola tarlalarında, rozet oluşumu aşamasının başlangıcı gözlemlenecektir.

Ekim ayında sonbahar ürünleri bir dizi zararlı tarafından saldırıya uğrar. Kışlık tahıl ürünlerinde, tarla sıçanının, buğday yaprak böceğinin ve tahıl sineklerinin zararlı faaliyeti izlenmeli ve zararlı yoğunluğu ekonomik zarar eşiğini (EZE) aştığında zamanında mücadele yapılmalıdır. Tarla sıçanı için EZE, dekar başına 2 aktif kolonidir; buğday yaprak böceği için ise 3 larva/m²'dir.

Kanolada, ay boyunca lahana gövdeli pire böceği (ergin bireyler) ve turp testere sineği (yalancı tırtıllar) oluşumu için sürveyler yapılmalı ve sayıları EZE'yi aştığında insektisit uygulaması yapılmalıdır.

Kaynak: NIMH