

Kasım başında tarımsal meteorolojik tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.11.2019 Брой: 11/2019



Geçen dönemin sonunda, Kuzeydoğu ve Kuzeybatı Bulgaristan'da 10 ila 20 l/m² arasında yağış düştü: Novo Selo'da – 10 l/m², Vidin'de – 16 l/m², Ruse'de – 11 l/m², Razgrad'da – 10 l/m² ve Silistra'da – 20 l/m². Bu yağışlar, kışlık tahıl ürünlerinin ilk gelişim aşamaları için koşulları geçici olarak iyileştirdi. Ülkenin geri kalan bölgelerinde yağış önemsizdi ve bu bölgelerde tarım ürünlerinin gelişimi, toprak nemi eksikliği nedeniyle zorlukla ilerliyor.

Önümüzdeki yedi günlük dönemde, tarımsal meteorolojik koşullar sıcak ve ağırlıklı olarak kuru hava tarafından belirlenecek. Toprak neminin sınırlayıcı bir faktör olmadığı yerlerde tarım ürünlerinin gelişimi, iklim normunun civarında ve üzerindeki sıcaklıklarda normal bir hızda ilerleyecek. Buğday için, Pavlikeni ve Haskovo tarımsal meteoroloji istasyonlarında çıkış fazı gözlemlenecek, Novachene ve Silistra tarımsal meteoroloji istasyonlarında

yaprak oluşumunun başlangıcı, Karnobat, Glavinitza ve Yambol tarımsal meteoroloji istasyonlarında ise üçüncü yaprak aşaması görülecek.

Kasım ayının başında, ilkbahar ürünleri için ayrılan tarlalarda toprak işleme, genç meyve ağaçları dikme ve toplu yaprak dökümünden sonra meyve ağaçlarını %5'lik üre çözeltisi ile ilaçlama için koşullar uygun olacak. İlaçlama işlemleri, rüzgar hızının 2–3 m/s'ye kadar olduğu sakın havalarda yapılmalıdır.

Kaynak: NIMH