

Aralık Ayı Tarımsal Meteorolojik Tahmini

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.12.2019 Брой: 12/2019



Kasım ayının ikinci yarısında normalin üzerindeki sıcaklıklar ve iyileşen toprak nem rezervleri, buğday, arpa ve kanolanın sonbahar vejetasyonunu uzattı. Aralık ayının ilk on günlük döneminde tarımsal meteorolojik koşullar oldukça dinamik olacak. Dönemin ortalarında öngörülen soğuma, kışlık tahıl ürünlerinde ve kanolada vejetasyon süreçlerinin yavaşlamasına ve yağışların (kar dahil) beklendiği Kuzey Bulgaristan'ın bazı bölgeleri ile batı bölgelerde ise bu süreçlerin durmasına yol açacak. İlk on günlük dönemin sonunda sıcaklıklarda bir artış beklenmekle birlikte, ortalama günlük değerler sonbaharda ekilen ürünlerin vejetasyonu için gerekli olan biyolojik minimumun altında kalacak.

İkinci ve üçüncü on günlük dönemlerin çoğu gününde, iklim normalleri civarında ve üzerinde öngörülen sıcaklıklar, ülkenin büyük bölümünde kışlık tahıl ürünlerini nispeten dormant bir durumda tutacak. En güneydeki

bölgelerde ve Karadeniz kıyısı boyunca buğday ve arpa için istisnalar mümkündür. Ayın ikinci yarısındaki nispeten daha sıcak dönemlerde, bu bölgelerde sonbaharda ekilen ürünlerde vejetasyon süreçlerinin kısa süreli olarak yeniden başlaması için koşulların oluşması ihtimali bulunmakla birlikte, ürünlerin fenolojik aşamalarında bir değişiklik beklenmemektedir.

Uzun süren sonbahar kuraklığı sonucunda, ürünler farklı gelişim aşamalarında kışa girecek. Güneydoğu Bulgaristan'daki bazı yerler hariç, ülkenin çoğu bölgesinde topraktaki su açığı buğday, arpa ve kışlık kanolanın vejetasyonunu geciktirdi. Sonbaharın sonunda, kışlık tahıl ürünlerinde hakim büyüme aşaması üçüncü yapraktır. Başlıca kuzeybatı bölgelerdeki (Băzovec, Pavlikeni tarımsal meteoroloji istasyonları) bazı buğday ekim alanları çıkış ve erken yaprak gelişimi aşamasındadır (1-2 yaprak). Ülkenin doğu bölgelerindeki buğday, kışlık tahılların başarılı bir şekilde kışladığı kardeşlenme aşamasındadır. Kanolada ise, sonbahar vejetasyonu sırasındaki nem açığının bir sonucu olarak, sadece bazı ekim alanları kışlamak için uygun aşama olan rozet aşamasındadır.

Aralık ayında, kar örtüsü olmayan ve daha uzun süreli devam eden koşullarda eksi 11°C'ye kadar düşmesi öngörülen minimum sıcaklıklar, çıkış ve erken yaprak gelişimi aşamasındaki kışlık tahıl ürünleri ile rozet oluşturmamış kanola ekim alanları için kritik olacaktır.

Kasım ayının üçüncü on günlük döneminde Güney Bulgaristan'ın birçok yerinde (Sandanski, Pazardzhik, Plovdiv, Haskovo, Kardzhali, Chirpan) 50-60 mm'yi aşan önemli yağışların ardından, üst toprak katmanlarındaki nem rezervlerinde önemli bir artış olmuş ve ülkenin ekilebilir bölgelerinin çoğunda sonbaharda ekilen ürünlerdeki nem açığı giderilmiştir. Aralık ayında, aylık norm civarında beklenen yağışlar, 100 cm'lik toprak katmanındaki toprak nem rezervlerini daha da artıracaktır.

Kaynak: NIMH