

'Kışa dayanıklı sebze ürünlerinin kış öncesi ekimi için uygun koşullara sahip dönem'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 15.12.2019 Брой: 12/2019



Aralık ayının ikinci on günlük döneminde, tarımsal meteorolojik koşullar mevsim normallerine göre ılıman bir hava durumu tarafından belirlenecek. Ülkenin tarla alanlarında, pozitif minimum sıcaklıkların yanı sıra, kışlık tahıl ürünlerinde vejetatif süreçlerin yeniden başlaması için gerekli olan biyolojik minimumun çevresinde ve üzerinde ortalama günlük değerler tahmin ediliyor. Buğday ve arpada gecikmiş vejetasyon koşulları, esas olarak güney bölgelerde ve Karadeniz kıyısı boyunca görülecek. İkinci on günlük dönemin sonunda, kışlık tahıl ürünlerinde üçüncü yaprak büyüme aşaması baskın olacak. Kasım ayında ekilen tarlalar iyi gelişmemiş olup çıkış ve ilk yaprak oluşumu aşamalarında bulunuyor. Başarılı bir kışlama için ön koşul olan kardeşlenme

aşamasındaki buğday, doğu bölgelerinin bir kısmında (Glavinitsa, Silistra, Tsarev Brod, D. Chiflik, Karnobat) ve Tuna Ovası'nda yer yer (Novachene) görülüyor.

Uzun süren sonbahar kuraklığının bir sonucu olarak, buğday tarlaları düzensiz bir sıklığa sahiptir. Metrekare başına bitki sayısı 350 ile 550–600 arasında değişmektedir.

Kanola (kolza) da ise, bitkilerin başarılı bir şekilde kışladığı bir büyüme aşaması olan rozet, sadece bazı tarlaların sonbahar vejetasyonu sırasında oluşmuştur.

Dönem boyunca önemli bir yağış tahmin edilmemekte olup, tarla alanlarının birçok yerinde, ilkbahar ürünleri için ayrılan alanların derin sürülmesi işlemlerinin yapılmasına imkan sağlayacak koşullar olacak. Güney bölgelerde, yaklaşan dönem bazı soğuğa dayanıklı sebze ürünlerinin – bezelye, bakla, havuç ve diğerlerinin – kış öncesi ekiminin yapılması için uygundur.

Kaynak: NIMH