

Ocak ayını çok düşük asgari sıcaklıklarla karşılıyoruz

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.01.2020 Брой: 1/2020



Ay boyunca öngörülen, eksi 15°C'ye kadar düşen minimum sıcaklıklar, kar örtüsüz ve daha uzun süreli kalıcılık koşullarında, sonbahar vejetasyonu döneminde kardeşlenme aşamasına giremeyen kışlık tahıl ürünleri için kritik olacaktır. Bu değerler aynı zamanda, sonbahar kuraklığı nedeniyle bir rozet (7-8 yaprak) oluşturmamış - bitkilerin başarılı bir şekilde kışladığı aşama - olan gelişmemiş kışlık kanola ekili alanları için de kritik olacaktır.

Yüksek Aralık sıcaklıkları, sonbaharda ekilen ürünlerin vejetasyonunu uzattı. Normallerin üzerindeki sıcaklıklar sonucunda, Batı Bulgaristan'daki Kneja, Sofya, Kyustendil tarımsal meteoroloji istasyonlarında, geç çıkan bazı kışlık tahıl ürünleri 2-3 yaprak oluşturdu.

Ocak ayında, tarımsal meteorolojik koşullar, iklim normalleri civarında ve üzerindeki sıcaklıklar tarafından belirlenecek ve bu da sonbaharda ekilen ürünleri ve çok yıllık plantasyonları dormansi (dinlenme) halinde tutacaktır. Kışlık tahıl ürünleri, yılın en soğuk ayına, uzun süren sonbahar kuraklığı ve geciken ekimin bir sonucu olarak farklı fenolojik aşamalarda girecek. Ekili alanların önemli bir kısmı üç yaprak aşamasında kışlayacak. Kışlama için uygun aşama olan kardeşlenme aşamasında ise, Doğu Bulgaristan'daki Silistra, Glavinitsa, Tsarev Brod, Dolni Chiflik, Yambol, Karnobat'taki buğday ekili alanlarının büyük bir kısmı bulunuyor. Tuna Ovası'ndaki bazı yerlerde, Nikolaevo, Pavlikeni tarımsal meteoroloji istasyonlarında, geç ekilen (Kasım ayında ekilen) bazı kışlık tahıl ürünleri zayıf durumda olup, çıkış ve ilk yaprak oluşumu aşamalarındadır.

Ay boyunca öngörülen, eksi 15°C'ye kadar düşen minimum sıcaklıklar, kar örtüsüz ve daha uzun süreli kalıcılık koşullarında, sonbahar vejetasyonu döneminde kardeşlenme aşamasına giremeyen kışlık tahıl ürünleri için kritik olacaktır. Bu değerler aynı zamanda, sonbahar kuraklığı nedeniyle bir rozet (7-8 yaprak) oluşturamamış - bitkilerin başarılı bir şekilde kışladığı aşama - olan gelişmemiş kışlık kanola ekili alanları için de kritik olacaktır.

Ocak ayında beklenen, normaller civarında ve altındaki yağışlar, 50 cm ve 100 cm katmanlarındaki toprak nem rezervlerini artıracaktır. Kış başında, ülkenin çoğu bölgesinde, bir metrelik toprak katmanındaki nem rezervi seviyesi mevsim için alışılmadık şekilde düşüktür. Batı Bulgaristan'daki Kneja, Kyustendil tarımsal meteoroloji istasyonlarındaki bazı yerlerde ve doğu bölgelerinin bazılarında, Razgrad, Sliven tarımsal meteoroloji istasyonlarında, tarla kapasitesinin (FC) %65'in altındadır.

Ocak ayında, bağlarda ve meyve bahçelerinde kış budaması yapmak için daha uygun koşullar, ayın ikinci yarısında oluşacaktır.

Kaynak: NIMH